

# 玻尿酸注射、副作用及併發症



## 玻尿酸注射

治療效果建議參考使用玻尿酸皮下植入物注射劑之中文仿單內容（如療效持續時間），實際成效會因個人本身各項因素縮短或延長，可於注射後 2 至 4 週內回診檢查。

### 治療後產生之併發症或副作用：

#### （一）注射後皮膚狀況：

1. 剛注射完可能有輕微流血，以紗布加壓數分鐘即可止血。剛注射完 6 個小時內請避免接觸注射部位。
2. 注射完後 1-2 天內可能會發生紅腫、瘀血、搔癢等現象，這是正常現象，數天內會自行消退，唇部腫脹的時間可能較長，但這並不是最後的外觀成效。
3. 注射後一週內避免去三溫暖或游泳。
4. 若您之前曾經有臉部皰疹的問題，則入針處可能有復發性皰疹，此乃正常現象，不必過度擔心，可以向您的醫師請求諮詢或治療。

#### （二）治療傷口癒合後須注意事項：

1. 在極少數的情況下，一個或多個注射點可能產生過敏反應，這會以紅腫不退、發癢、硬塊或隆起來表現。如有上述情況請返診讓醫師為您評估。
2. 有更少數的例子會有延遲性的過敏反應，在注射數個月後發生紅腫硬塊的現象，如有此情況也要返診由醫師為您評估。

振興醫院美容醫學科關心你。

服務電話:(02)2826-4400 轉 3333 或(02)2828-5282