

## 肉毒桿菌注射、副作用及併發症



### 肉毒桿菌注射

肉毒桿菌素注射劑依衛生福利部核准之仿單內容，主要用於治療成人中風後之手臂痙攣、眼瞼痙攣、半邊顏面痙攣、痙攣性斜頸、小兒腦性麻痺引起之肌肉痙攣、皺眉紋等顏面部位之皺紋。

### 治療後產生之併發症或副作用：

#### (一) 注射後皮膚狀況：

1. 剛注射完可能有輕微流血，以紗布加壓數分鐘即可止血。剛注射完6個小時內請避免接觸注射部位。
2. 依注射部位不同可能有不同的副作用。較常見的包括下針部位的腫脹及瘀血(魚尾紋)、複視(魚尾紋)、眼皮下垂或眉毛下垂(皺眉紋、抬頭紋)、頭痛(抬頭紋)、咀嚼肌無力或是表情肌無力(國字臉)。這些副作用皆為短暫性，也可以請您的醫生為您評估。
3. 注射後效果會在三天或一周後出現。如果是國字臉的改善可能需時更久，約二到四週。

#### (二) 肉毒桿菌注射後須注意事項：

1. 在注射完六小時內盡量保持頭部挺直，避免躺下、前傾、運動。
2. 注射完六小時內盡量勿接觸熱源，像是洗髮吹髮、以熱水洗臉、靠近瓦斯爐煮飯、接受其他加熱皮膚的療程（例如電波拉皮）等等。

振興醫院美容醫學科關心你。

服務電話:(02)2826-4400 轉 3333 或(02)2828-5282