



振兴医疗财团法人振兴医院

玻尿酸注射、副作用及并发症

一、玻尿酸注射

治疗效果建议参考使用玻尿酸皮下植入物注射剂之中文仿单内容（如疗效持续时间），实际成效会因个人本身各项因素缩短或延长，可于注射后 2 至 4 周内回诊检查。

二、治疗后产生之并发症或副作用：

(一)注射后皮肤状况：

1. 刚注射完可能有轻微流血，以纱布加压数分钟即可止血。刚注射完 6 个小时内请避免接触注射部位。
2. 注射完后 1-2 天内可能会发生红肿、瘀血、搔痒等现象，这是正常现象，数天内会自行消退，唇部肿胀的时间可能较长，但这并不是最后的外观成效。
3. 注射后一周内避免去三温暖或游泳。
4. 若您之前曾经有脸部疱疹的问题，则入针处可能有复发性疱疹，此乃正常现象，不必过度担心，可以向您的医师请求咨询或治疗。

(二)治疗伤口愈合后须注意事项：

1. 在极少数的情况下，一个或多个注射点可能产生过敏反应，这会以红肿不退、发痒、硬块或隆起来表现。如有上述情况请返诊让医师为您评估。
2. 有更少数的例子会有延迟性的过敏反应，在注射数个月后发生红肿硬块的现象，如有此情况也要返诊由医师为您评估。