



一、何谓球囊扩张术、支架装置术？

在局部麻醉下，一般经由股动脉或桡动脉置入导管，将导引线通过病灶后，球囊导管藉导引线进入冠状动脉狭窄处，再将球囊充气扩张，藉膨胀的球囊，将阻塞的血管管径扩大，以增加血流的畅通，进而改善因心肌缺血所造成的症状。若球囊扩张无法将狭窄处适当的扩大，或因病灶血管为重要之血管，则在医师建议下置放血管支架。球囊导管、导线及导管最后会移出，支架永久置放在血管内。

二、球囊扩张术前准备

- (一)按医嘱服用阿司匹林、保栓通、百无凝或抑凝安等抗血小板药物及降血脂药物，如对阿司匹林、显影剂或其他药物过敏请告知医护人员。
- (二)住院期间接受验血、胸部 X 光、心电图检查。
- (三)签立同意书并请家属于病患施行心导管时，务必到场陪伴。
- (四)检查前禁食至少六小时。
- (五)保持轻松的心情，将使检查顺利进行。

三、球囊扩张术后注意事项

- (一)手术完成后，视病情需要，可能会转至监护中心观察。
- (二)若回到病房，则请卧床休息，有必要时会有心电图及抽血检查，有任何不适请通知护理人员。
- (三)注意伤口有无出血倾向，包括肿痛、鼠蹊处有温湿的感觉或后腰疼痛。
- (四)术后可恢复正常饮食，若无特别禁忌，可多摄取水份以利显影剂排出。

四、出院后注意事项

- (一)按医嘱服用药物，并定期回诊。
- (二)术后可恢复正常活动，避免太过剧烈，可向医师咨询。
- (三)规律的运动及均衡的饮食。
- (四)戒烟、保持规律的生活作息。
- (五)居家规律测量血压、血糖、心律。
- (六)注意伤口有无红、肿、热、痛等发炎现象，若有请提早就医。

五、参考文献

张毓琳、舒婉娟(2019). 降低经股动脉执行心导管术后病人腰背不适感之改善项目. 台大护理杂志, 15(2), 187-202. [https://doi.org/10.6740/NTUHJN.201907_15\(2\).0017](https://doi.org/10.6740/NTUHJN.201907_15(2).0017)

Yeter, K., Magfiret, K. (2019). The effect of the application of cold on hematoma, ecchymosis, and pain at the catheter site in patients undergoing percutaneous

 振兴医疗财团法人振兴医院
球囊扩张术概说

coronary intervention. International Journal of Nursing Sciences, 6(4), 378–384.
<https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2019.09.005>

振兴医疗财团法人振兴医院 制作
台北市北投区振兴街 45 号
电话：(02) 2826-4400