



愛克痰 Actein 200mg/3gm 兒童用藥指導單張

109.07.18 修訂
藥衛 092

一、藥物作用：

可減少呼吸道粘膜分泌的粘稠性，使痰易於咳出。

二、使用方式：

醫師依兒童症狀、年齡、與體重決定用量，約 1/4 包~1 包，本品已為粉末，可使用藥水量杯進行分裝。

愛克痰 Actein 200mg/3gm Pack 粉末一包 3ml -1/2 包 Actein 為 1.5ml 粉末 -1/3 包 Actein 為 1 ml 粉末
--



三、儲存條件：

本品極易吸濕，請置於乾燥處所，於 15-30°C 下存放。

*本指導單張未收載藥品的資訊，若有任何疑問，請詢問您的醫師或藥師。
振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604

5600-R-J092

1/1

版次：3



愛克痰 Actein 200mg/3gm 兒童用藥指導單張

109.07.18 修訂
藥衛 092

一、藥物作用：

可減少呼吸道粘膜分泌的粘稠性，使痰易於咳出。

二、使用方式：

醫師依兒童症狀、年齡、與體重決定用量，約 1/4 包~1 包，本品已為粉末，可使用藥水量杯進行分裝。

愛克痰 Actein 200mg/3gm Pack 粉末一包 3ml -1/2 包 Actein 為 1.5ml 粉末 -1/3 包 Actein 為 1 ml 粉末
--



三、儲存條件：

本品極易吸濕，請置於乾燥處所，於 15-30°C 下存放。

*本指導單張未收載藥品的資訊，若有任何疑問，請詢問您的醫師或藥師。
振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604

5600-R-J092

1/1

版次：3