



## 細胞毒性類用藥指導單張

109.07.18 修訂  
藥衛 080

目前用藥(v)	學名	商品名	中文商品名
	Bleomycin	Bleocin	撲類惡
	Doxorubicin	Adriblastina	艾黴素
	Doxorubicin	Lipo-Dox	力得微脂粒
	Epirubicin	Pharmorubicin	速溶泛艾黴素
	Mitomycin	Mitomycin-C	排多癌

## 一、使用期間該注意些什麼？

1. 使用此類藥物須留意心肺功能的改變，若發生嚴重的呼吸喘、心律不整、尿量變少等請立即就醫。
2. 本藥可能會干擾女性的月經週期及可能會影響男性精子產生，也可能會傷害胎兒，若在接受化療期間或化療之後計畫懷孕，請向您的醫師做進一步的諮詢，必要時確實做好避孕措施以避免懷孕。
3. 每一種藥物都有副作用，若有以下情況，請勿驚慌：噁心及嘔吐、胃痛及痙攣、便秘、腹瀉、頭痛、頭髮變稀疏或易斷裂等，這些症狀會隨停止化療藥物之使用而慢慢減弱。
4. 若有下述症狀：不尋常的挫傷或出血、腿或手臂刺痛、麻木、嚴重腹部或肌肉痙攣、行走困難、聲音沙啞、發燒、寒顫、喉嚨痛、小便頻繁、注射部位紅腫、疼痛等，請就醫並告知您的醫師。
5. 若準備使用的化療藥物為 Bleocin，而您有肺、肝或腎臟疾病，請事先告知您的醫生。
6. 若準備使用的化療藥物為 Adriblastina 或 Pharmorubicin，而您有肝臟或心臟相關疾病，或先前曾接受過其他化療或放療請先告知醫生。

## 二、可能引起的副作用？

\*副作用發生率:分別以&gt; 10% ●, 1%~10% ⊙, &lt;1% ○代表之

學名 (商品名)	感染	虛弱	噁心	腹瀉	皮膚刺激	掉髮	腎功能惡化	肝毒性	耳毒性	口腔炎	腹痛	出血	神經毒
Doxorubicin (Adriblastina®) 艾黴素	●	●	●	●	●	●		○		●	⊙	○	●

學名 (商品名)	感染	虛弱	噁心	腹瀉	皮膚刺激	掉髮	腎功能惡化	肝毒性	耳毒性	口腔炎	腹痛	出血	神經毒
Bleomycin (Bleocin <sup>®</sup> ) 撲類惡		●	●	○	●	●	○	○		●		◎	
Doxorubicin (Lipo-Dox <sup>®</sup> ) 力得微脂粒	◎	●	●	●	●	●	○	◎		◎		○	◎
Epirubicin (Pharmorubicin <sup>®</sup> ) 速溶泛艾黴素	●		●	●	◎	●		◎		◎	◎	○	○
Mitomycin (Mitomycin-C <sup>®</sup> ) 排多癌		○	●	○	○	◎	◎	○		◎	○	◎	

\*本指導單張未收載藥品的資訊，若有任何疑問，請詢問您的醫師或藥師。

振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604