

Molnupiravir 用藥指導單張

111.05.13 修訂
藥衛 101

學名	中文商品名	劑量	圖片
Molnupiravir	莫納皮拉韋 (非正式中文名)	200 毫克	

一、為什麼要使用這些藥？

此為抗病毒藥品，用於治療成人發病 5 天內且符合衛福部適應症之輕、中度新型冠狀病毒疾病。



疾管署 Molnupiravir
口服懸浮液配置建議



疾管署 Molnupiravir
醫療照護者用藥說明

二、如何使用這個藥？

- 每 12 小時一次，每次服用 4 顆，持續服用五天。可隨餐或不隨餐服用。請務必依醫師指示按時用藥完成完整五天療程。
- 使用鼻胃管/口胃管的病人，可將膠囊配置成口服懸浮液。打開四顆膠囊並將內容物置於杯中或注射器，再加入 40 毫升的水，均勻混合攪拌 3 分鐘，配置完畢請盡快服用。可額外再給予水分確保所有藥物吞嚥完成，水量上限為 240 毫升。(詳細資訊可掃描上方 QR code)

三、使用期間該注意些什麼？

- 本藥未核准 18 歲以下病人使用。
- 若您為育齡期女性，於治療期間和使用最後一劑藥品後 4 天內，應採取可靠的避孕措施。若您為男性，在用藥期間與使用最後一劑藥品後至少 3 個月內，應採取避孕措施。
- 若您正在餵哺母乳或有哺乳的計畫，於治療期間和使用最後一劑藥品後 4 天內不建議餵哺母乳。
- 若您有任何過敏史、患有任何嚴重疾病或正在使用任何藥品，請主動告知醫師及藥師以評估用藥合適性。

四、可能引起的副作用？

腹瀉、噁心、暈眩等。

五、忘記使用怎麼辦？

1. 平常服藥時間的 10 小時內，若漏服一劑藥品，請於想起時立即服藥。
2. 若漏服藥品超過 10 小時，請跳過漏服的劑量，於下一個排定的時間正常服藥，不可以服用兩倍劑量。

六、此藥儲存時的條件為何？

請儲存於 30°C 以下乾燥的環境，遠離熱源及避免陽光直射。

*本指導單張未收載藥品的資訊，若有任何疑問，請詢問您的醫師或藥師。

振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604