



## 倍拉維 Paxlovid 用藥指導單張

113.03.07 修訂  
藥衛 100

| 學名                       | 英文商品名    | 中文商品名 | 劑量   | 圖片  |
|--------------------------|----------|-------|--|---|
| Ritonavir + Nirmatrelvir | Paxlovid | 倍拉維   | Ritonavir<br>100mg *1 (白色)<br>Nirmatrelvir<br>150mg *2 (粉紅色) |  |

## 一、為什麼要使用這些藥？

此為抗病毒藥品，用於治療發病 5 天內且符合衛福部適應症之輕、中度新冠肺炎。

## 二、如何使用這個藥？

1. 每日早晚各一次，連續使用五天。
2. 請務必依醫師指示按時用藥並完成療程，不可自行增減藥量或改變使用方式，以免影響治療效果。

| 一般劑量  |   | 中度腎功能不全 (eGFR 介於 30-60 mL/min)   |   |
|---|---|--|---|
| 每日 2 次，<br>每次服用 3 粒   | 1 粒白色 Ritonavir +<br>2 粒粉色 Nirmatrelvir | 每日 2 次，<br>每次服用 2 粒  | 1 粒白色 Ritonavir +<br>1 粒粉色 Nirmatrelvir |
|  |   |  |   |

3. 可隨餐或不隨餐服用，整粒吞服不得咀嚼、分開或壓碎。

## 三、使用期間該注意些什麼？

1. 本藥未核准於小於 12 歲或體重小於 40 公斤的青少年病人使用。
2. 若您有肝腎疾病，請告知醫師及藥師以評估藥品劑量及合適性。
3. Paxlovid 與多種藥品可能導致潛在交互作用，若有使用以下藥品，請與醫師聯絡。

下列藥物禁止與 Paxlovid 併用：

- 抗心律不整藥：amiodarone、dronedarone、flecainide、propafenone、quinidine
- $\alpha 1$ -腎上腺素受體拮抗劑：alfuzosin

- 抗心絞痛藥：ranolazine
- 抗痛風藥：colchicine
- 抗精神病藥：lurasidone、pimozide
- 良性攝護腺肥大藥：silodosin
- 心血管藥：eplerenone、ivabradine
- 麥角衍生物：dihydroergotamine、ergotamine、methylergonovine
- HMG-CoA 還原酶抑制劑：lovastatin、simvastatin (可先暫時停用)
- 免疫抑制劑：voclosporin
- 微粒三酸甘油酯傳送蛋白抑制劑：lomitapide
- 偏頭痛藥：eletriptan、ubrogepant
- 礦物性皮質激素受體拮抗劑：finerenone
- 類鴉片拮抗劑：naloxegol
- 肺動脈高壓藥物：sildenafil
- 鎮定/安眠藥：triazolam、口服 midazolam
- 血清素受體 1A 致效劑/血清素受體 2A 拮抗劑：flibanserin
- 血管加壓受體拮抗劑：tolvaptan
- 抗癌藥物：apalutamide
- 抗痙攣藥：carbamazepine、phenobarbital、primidone、phenytoin
- 囊腫纖維化跨膜傳導調節蛋白增效劑：lumacaftor/ivacaftor
- 抗分枝桿菌藥物：rifampin、rifapentine
- 草藥：聖約翰草



疾管署 Paxlovid  
病人用藥須知 0510



衛福部 Paxlovid  
致醫療照護者用藥說明

4. 若您有懷孕、哺乳計劃，或正在懷孕或哺乳，請與醫療照護人員討論。

#### 四、可能引起的副作用？

1. 若發生食慾不振、皮膚和眼白發黃（黃疸）、尿液顏色變深、糞便顏色變淺、皮膚發癢及胃部（腹部）疼痛、味覺改變、腹瀉、高血壓、整體感覺不適等症狀，請諮詢您的醫療照護人員。
2. 若您為 HIV 感染者，同時使用本藥品治療可能會導致某些 HIV 藥品無法正常發揮其療效。

#### 五、忘記使用怎麼辦？

1. 從漏服藥品算起 8 小時以內，請於想起時立即服藥。
2. 從漏服藥品算起超過 8 小時，請跳過漏服的劑量，於下一個排定的時間正常服藥，不可以服用兩倍劑量。

#### 六、此藥儲存時的條件為何？

1. 請儲存於 25°C 以下室溫及乾燥的環境，遠離熱源及避免陽光直射。

\*本指導單張未收載藥品的全部資訊，若有任何疑問，請詢問您的醫師或藥師。  
振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604