





DPP4 抑制劑類口服糖尿病用藥指導單張 (DPP4 Inhibitors)

109.07.18 修訂
藥衛 084

學名	英文商品名	中文商品名	劑量	圖片
Vildagliptin +Metformin	Galvus Met	高糖優美 膜衣錠	50/850mg	
Sitagliptin	Januvia	佳糖維膜衣錠	100mg	
Sitagliptin + Metformin	Janumet	捷糖穩膜衣錠	50/500mg	
Saxagliptin, Metformin	Kombiglyze XR	康併莎持續性 藥效膜衣錠	5mg/1000mg	
Saxagliptin	Onglyza	昂格沙膜衣錠	5mg	
Linagliptin	Trajenta	糖漸平膜衣錠	5mg	

一、為什麼要使用這些藥？

治療第二型糖尿病。

二、如何使用這個藥？

上述藥品因藥效短不一，每日服用次數及每次劑量，請遵照醫囑。

三、使用期間該注意些什麼？

1. 為使糖尿病受到良好控制，請遵醫囑控制飲食、飲酒量，養成規律運動習慣，並按時檢查血糖、糖化血紅素及尿糖。
2. 服用此類藥品前，若有下列事項請先告知醫師：懷孕或準備懷孕、哺乳、曾有藥物過敏、其他疾病（肝臟、腎臟等疾病）、將要進行手術、服用中草藥或保健食品。
3. 若您準備進行特殊檢查或治療，需要禁食時，請先與醫護人員確認是否需按時服用糖尿病藥物，以避免服藥後未進食造成的低血糖。
4. 如果服用藥量過大、服用時間不對、忘了服藥後進食、或額外的運動，都可能引起低血糖，需瞭解低血糖的預防與處理。
5. 生病時仍需按規定服藥，注意飲食，不可任意停藥。若因生病引起無法進食的情形，請暫時不要服用藥物，並立刻就醫。
6. 如發生嚴重胃痛、發冷、便秘、噁心、嘔吐、食慾喪失、發燒等，可能為胰臟炎之症狀，須立即就醫。
7. 康併莎持續性藥效錠(Kombiglyze XR)須整粒吞服，除非醫師有特殊指示，不建議磨碎或嚼碎。此藥的非活性成分有時可能會以類似於原藥錠的含水軟塊從糞便排出。

四、可能引起的副作用？

頭痛、水腫、鼻塞或流鼻水、喉嚨痛、肌肉痠痛、腹瀉、噁心、嘔吐。

低血糖症狀，如心悸、臉色蒼白、冒冷汗、頭痛、頭暈、易怒、虛弱、疲倦、嚴重飢餓感、心跳過快…等。請隨身備有葡萄糖錠、葡萄糖水或含糖的食物，來處理低血糖症狀。

五、忘記使用怎麼辦？

想起時，立即服用；若已接近或已到下一次服藥時間，只需服用下一次藥量，切勿同時服用兩次的劑量。

六、此藥儲存時的條件為何？

請連同藥袋或是原包裝儲存於密閉容器內，於室溫、乾燥處避光保存；避免置放於孩童可以取得的場所。

*本指導單張未收載藥品的資訊，若有任何疑問，請詢問您的醫師或藥師。

振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604