



陰道塞劑使用通則用藥指導單張

109.07.18 修訂
藥衛 048

學名	英文商品名	中文商品名	劑量	圖片
Miconazole nitrate	Antifungal Vag Tab	無黴陰道錠	100mg	
Clotrimazole	Clomazole Vag Tab	克黴樂陰道錠	500mg	
Fenticonazole	Lomexin Vag Tab	洛黴欣栓劑	200mg	
Sertaconazole	Zalain Vag Tab	達來陰道錠	500mg	
Chloramphenicol Carbarsone Benzethonium	Chlotin Vag Supp (複方)	克路淨栓劑	100mg 100mg 1mg	

一、為什麼要使用這些藥？

1. 無黴陰道錠、克黴樂陰道錠、洛黴欣栓劑、達來陰道錠主成份為抗黴菌劑。用來治療黴菌（多數為白色念珠菌）引起之陰道感染症。
2. 克路淨栓劑成份複方抗菌劑。作用為急慢性陰道炎、由陰道滴蟲引起之陰道炎、子宮頸管炎其他各種原因引起之白帶。

二、如何使用這個藥？

1. 通常建議在晚上、洗澡後，睡前使用。
2. 將雙手洗淨，並用乾淨之紙巾將雙手擦乾。
3. 將陰道塞劑的外膜撕開，將除去外包裝之陰道塞劑用溫水潤濕。

4. 依照處方劑量，採蹲姿或仰臥的姿勢，雙腳彎曲，將藥片用手指推入陰道深處（約一指深）。
5. 使用完畢請再度洗淨雙手。

三、使用期間該注意些什麼？

1. 陰道塞劑不可用於身體其他部位，不可以吞服。
2. 應完成全程治療，不宜任意停藥。
3. 月經期間仍要繼續使用。

四、可能引起的副作用？

若產生持續性刺激反應，如：燒灼感或搔癢時，請立刻告知醫師，由醫師評估是否繼續使用。

五、忘記使用怎麼辦？

如果忘記用藥應立刻補用該次劑量。若是很接近下次用藥時間，則跳過該次劑量，依原來時間使用下一次的劑量，絕不可一次使用兩倍藥量，並請告知醫師。

六、此藥儲存時的條件為何？

儲存於室溫陰涼、乾燥處，避免陽光直接照射。並請存放於兒童接觸不到的地方。

*本指導單張未收載藥品的資訊，若有任何疑問，請詢問您的醫師或藥師。

振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604