

內舒拿®
Nasonex®
(mometasone furoate aqueous nasal spray)

鼻噴劑 使用說明

本衛教資料提供醫護相關人員給予服用內舒拿之病患衛教使用

兒童用藥注意事項：請父母依照上述步驟幫助兒童使用內舒拿
如有任何有關疾病、醫療或藥品方面的疑問，請務必與專業醫護人員詢問。



美商默沙東藥廠股份有限公司台灣分公司
台北市信義區信義路五段106號12樓

RESP-1060997-0003 01/14

產品圖樣因放大比例與色差，和實體略有不同，
僅供參考，請以實物為準。

內舒拿®
Nasonex®
(mometasone furoate aqueous nasal spray)

鼻噴劑 使用說明



140 metered sprays

Nasonex®
mometasone furoate

Aqueous
Nasal Spray 0.05%

Once daily

SCENT-FREE

Each metered dose delivers
Mometasone Furoate Monohydrate


鼻噴劑 使用說明

為達到最大的藥效及最低的併發症風險，必須正確使用NASONEX® (mometasone furoate aqueous nasal spray)。使用前充分搖動藥瓶，並仔細閱讀使用方法，按照指示用藥。請參考以下簡單的使用步驟：

1 請將綠色蓋子(防塵蓋)打開



2 第一次使用時，請以大拇指支撐瓶底，食指和中指押住瓶身白色的頸部，一壓一放幫浦約6-7次，直到均勻的噴霧產生。使用前應充分振搖容器。如果已有14天或更久未曾使用，下次使用前應重新引流。



3 壓住一邊鼻孔，輕輕擤出鼻涕以清潔鼻孔。頭部微向前傾，持瓶身向上並傾斜45°，小心將噴頭伸進鼻孔，以大拇指支撐瓶底，食指和中指押住瓶身白色的頸部一次壓到底(是一個噴劑量)，噴完後自此鼻孔輕輕吸氣，另一邊鼻孔重複上述動作。



4 請將綠色蓋子(防塵蓋)蓋回。



請勿穿刺噴頭

