



紫杉醇用藥指導單張

109.07.18 修訂
藥衛 076

目前用藥(v)	學名	商品名	中文商品名
	Docetaxel	Taxotere	剋癌易
	Paclitaxel	Taxol	汰癌勝

一、使用期間該注意些什麼？

1. 本藥可能會干擾女性的月經週期以及可能會停止男性精子產生，也可能會傷害胎兒，若在接受化療期間或化療之後計畫懷孕，請向您的醫師做進一步的諮詢，必要時確實做好避孕措施以避免懷孕。
2. 每一種藥物都可能有副作用，如：頭髮變稀薄或易斷、腹瀉、噁心、嘔吐、食慾降低等，這些症狀會隨停止化療藥物之使用而慢慢改善。
3. 若您有產生下述症狀：不尋常的挫傷或出血、嚴重嘔吐、寒顫、咳嗽、喉嚨痛、肌肉酸痛、骨頭疼痛、嘴巴起水泡及其他類似感冒的症狀、雙腳腫大及體重增加等，請知會您的醫師。
4. 若您有肝、心臟或神經方面的疾病請先告知醫生。
5. 施打疫苗前請先與醫師討論。

二、可能引起的副作用？

*副作用發生率：分別以 > 10% ●, 1%~10% ⊙, <1% ○ 代表之

學名 (商品名)	感染	虛弱	噁心	腹瀉	皮膚刺激	掉髮	腎功能惡化	肝毒性	耳毒性	口腔炎	腹痛	出血	神經毒
Docetaxel (Taxotere [®]) 剋癌易	●	●	●	●	●	●	○	⊙	○	●	⊙	⊙	●
Paclitaxel (Taxol [®]) 汰癌勝	●	○	●	●	○	●	●	●	○	●	●	●	●

*本指導單張未收載藥品的資訊，若有任何疑問，請詢問您的醫師或藥師。

振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604