



卓定康 Certican 用藥指導單張

109.07.18 修訂
藥衛 089

學名	英文商品名	中文商品名	劑量	圖片
Everolimus	Certican	卓定康	0.25 毫克	Certican 0.25mg Tab 卓定康錠 0.25 毫克
Everolimus	Certican	卓定康	0.5 毫克	CERTICAN 0.5mg Tab 卓定康錠 0.5 毫克

一、為什麼要使用這些藥？

卓定康是一種抗排斥藥，用於治療已接受器官移植的病人，能夠協助防止您的身體對移植器官產生排斥反應。

二、如何使用這個藥？

一天服用兩次，兩次用藥之間最好相隔 12 小時，並於每天相同時間服藥。

三、使用期間該注意些什麼？

- 由於此藥可能會影響傷口癒合，因此進行任何手術前務必告知醫師，評估抗排斥藥物是否需進行調整。
- 服藥期間可能會出現手部、足部或四肢腫脹，這稱為水腫。可以嘗試以下列方式預防水腫，或於水腫出現時加以舒緩：坐著或躺著的時候抬高患部；多走路或提高活動量，協助體液回到您的循環系統中；避免久站；坐著的時候避免翹腳；醫師可能還會開立利尿劑，或建議您使用彈性襪並減少飲食中的鹽分。
- 服藥期間可能會出現口腔潰瘍，持續使用有時會自行緩解。可以下列方式來降低不適：刷牙以及使用牙線時請將動作放輕；鹽水或抗菌漱口水可以有所幫助，但不要使用酒精性漱口水；使用吸管喝水或飲料，避免液體碰觸口腔內潰瘍部位；適量地於患部塗抹口內膏。
- 採行避孕措施，如果您已懷孕或有計畫懷孕，請立刻告知醫師。
- 如果您身上任何部位出現腫塊、出現任何痣，或者您在原有的痣上察覺到變化，

請告知您的醫師。

6. 於日光曝曬的環境下，戴帽子、穿戴保護性衣物並塗抹防曬產品。
7. 服藥期間不可吃葡萄柚或喝葡萄柚汁。

四、可能引起的副作用？

卓定康常見的副作用有噁心、影響傷口癒合、水腫、高血脂、蛋白尿、口腔潰瘍、疲累……等。

五、忘記使用怎麼辦？

想起時，立即服用；若已接近或已到下一次的服藥時間，只需服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍藥量。

六、此藥儲存時的條件為何？

將藥物儲存在通風、陰涼、乾燥處，遠離高溫、高溼度（不要放置於廚房或浴室）和直接的陽光照射，並置於小孩拿不到的地方。

*本指導單張未收載藥品的資訊，若有任何疑問，請詢問您的醫師或藥師。

振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604