

Q 使用楊森多瑞喜穿皮貼片劑12微公克/小時之前，您的止痛用藥為？

NSAIDs Ultracet Morphine Fentanyl patch Others

楊森多瑞喜穿皮貼片劑 12微公克/小時 使用方法：

步驟

1



選擇適當的部位，建議前胸、後背及上手臂，並清洗擦拭乾淨。若黏貼處有毛髮以剪刀清除乾淨，但不可使用刮刀，避免皮膚受傷。

步驟

2



撕開貼片的外包裝，使其像書本般打開，將貼片取出。

步驟

3



貼片取出後，從S型切口處將背膠撕除。

步驟

4



黏貼後輕壓30秒，使黏貼更緊密。

步驟

5



使用後，用清水洗手，勿用肥皂，同時紀錄使用日期及時間。

步驟

6



3天後撕下，並將貼片對折，放入袋中回收，於回診時由醫師蓋章後，在領藥時將廢片及使用紀錄表繳回藥局。

本院關心您

疼痛評估量表

請指出最能形容您現在疼痛程度的數字。



止痛藥答客問

1 我應該要忍耐疼痛嗎？

選擇忍耐疼痛是最不正確的。會發生疼痛一定是有原因，如果您一直忍耐不說出來，醫師和護士就不能知道您真正的狀況。

2 使用鴉片類止痛藥物，會不會成癮？

不會。在疼痛患者的藥物成癮是很罕見的。

3 使用止痛藥該注意哪些事情呢？

「按時服用的止痛藥」可幫助您解除持續性的疼痛。

「需要時服用的止痛藥」可幫助您解除突然發生的疼痛。

請按照時間使用止痛藥物，千萬不要忘了使用或者總是痛了才使用。

4 使用鴉片類止痛藥物，是不是表示病況很嚴重？更痛的時候會不會沒有藥可以用？

鴉片類止痛藥與病情沒有直接的連帶關係。醫師會根據您的疼痛情形調整止痛藥物，不管疼痛程度如何，都會有藥物可以處理的。

