


寧司泰定 Nystatin 用藥指導單張

109.07.18 修訂
藥衛 022

學名	英文商品名	中文商品名	劑量	圖片
Nystatin	Nystatin	寧司泰定	500000u /Ca	 NYSTATIN 5 MU 寧司泰定膠囊

一、為什麼要使用這些藥？

治療由白色念珠菌所引起之口腔，皮膚及腸內的感染。

二、如何使用這個藥？

1. 用法及劑量應遵照醫師指示服用，有問題可請教藥師或醫師。
2. 如為漱口用，先將所有膠囊打開後將粉末倒入藥液中，混合均勻後每次以 20 ml ~30 ml 藥液含於口腔 1 分鐘後再吞服。

三、使用期間該注意些什麼？

1. 使用本藥前有下列情況請先告知醫師：懷孕、計畫懷孕、哺乳、曾有藥物過敏、尚有服用其他藥物。讓醫師決定是否可用藥。
2. 治療期間不要因感染症狀消失就擅自停藥，必須繼續使用到整個療程結束，否則可能會復發。

四、可能引起的副作用？

大量口服偶而會出現噁心、嘔吐、腹瀉、胃痛。

五、忘記使用怎麼辦？

想起時立刻補服一次劑量，若是很接近下次服藥時間，則跳過一次，依原來時間服用下一次的劑量，絕不可一次服用兩倍藥量，並請告知醫師。

六、此藥儲存時的條件為何？

室溫乾燥避光儲存。放在小孩拿不到處，以免誤食造成危險。

*本指導單張未收載藥品的資訊，若有任何疑問，請詢問您的醫師或藥師。

振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604