



寧康口內膠 Nincort Oral Gel 用藥指導單張

109.07.18 修訂
藥衛 019

學名	英文商品名	中文商品名	劑量	圖片
Triamcinolone Acetonide	Nincort	寧康口內膠	0.1% 6gm /tube	

一、為什麼要使用這些藥？

齒肉、口腔粘膜、舌、潰瘍性口內炎、口角炎等急慢性炎症之治療、齒槽膿漏、假牙刺激部疾患。

二、如何使用這個藥？

通常一日一次，最好於就寢時使用，症狀嚴重時，一日 2-3 次試量塗抹於患處，使用後暫時避免飲食。

三、使用期間該注意些什麼？

1. 若局部發生化膿性之感染時，請停止服用。
2. 發生過敏現象時請即停止使用。
3. 使用本藥七天後患處若無顯著改善，需就醫檢查。
4. 結核病、糖尿病及胃潰瘍患者，不可使用本藥。

四、可能引起的副作用？

少見。

五、忘記使用怎麼辦？

想起時立刻補服一次劑量，若是很接近下次服藥時間，則跳過一次，依原來時間服用下一次的劑量，絕不可一次服用兩倍藥量，並請告知醫師。

六、此藥儲存時的條件為何？

應置於攝氏 15~25°C 乾燥處所；如發生變質或過期，不可再使用。

*本指導單張未收載藥品的資訊，若有任何疑問，請詢問您的醫師或藥師。

振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604