




## Sulfonylureas 磺醯脲類口服降血糖藥物用藥指導單張

109.07.18 修訂  
藥衛 088

學名	英文商品名	中文商品名	劑量	圖片
Gliclazide	Diamicon MR	岱蜜克龍 持續性藥效錠	30 mg	
Glimepiride	Amaryl	瑪爾胰錠劑	2 mg	
Glimepiride, Metformin	Amaryl M (複方)	美爾胰錠	2mg 500mg	

## 一、為什麼要使用這些藥？

用於第二型糖尿病病人，以增加體內胰島素的分泌，來降低血糖。

## 二、如何使用這個藥？

於飯前 30 分鐘或隨餐服用。岱蜜克龍持續性藥效錠須整粒吞服，不可剝半、磨粉。

## 三、使用期間該注意些什麼？

1. 為使糖尿病受到良好控制，請遵醫囑控制飲食、飲酒量，運動應規律，定期檢查血糖、糖化血紅素及尿糖，及腎功能檢查。飲食及運動應規律，定量且定時。延遲飲食或過度運動可能引起低血糖。
2. 服藥期間，應告知醫師所有服用之藥物。
3. 若您有蠶豆症(葡萄糖六磷酸鹽去氫酵素缺乏症，G6PD)請告知醫師，可能會發生貧血。
4. 如懷孕或授乳應告知醫師，一般懷孕之糖尿病應以胰島素控制為主。
5. 有些人服藥後會對陽光敏感，應避免曬太多陽光或適度防曬(外出可擦防曬油)。
6. 如有任何手術、牙科處置及急診處理，應告知醫師服用此類藥品。

#### 四、可能引起的副作用？

1. 如有低血糖症狀，應立即進食含糖飲料，如果汁、糖水、方糖。如未見改善，則應送急診。低血糖症狀-（極度飢餓感、心悸、顫抖、持續發冷、冒冷汗、昏亂、頭痛等）。
2. 若發生皮膚發疹、發癢、發紅、嚴重晒傷；皮膚、眼睛變黃，大便顏色變淡、尿色變深；不正常出血或瘀血；喉嚨痛、持續發燒等，請立即就醫。
3. 服藥初期可能會有胃痛、胃脹或腹瀉的現象，短暫性視力障礙，但少見，待逐漸適應後症狀會緩解，如症狀持續，於就診時應告知醫師。

#### 五、忘記使用怎麼辦？

想起時，立即服用；若已接近或已到下一次服藥時間，只需服用下一次藥量，切勿同時服用兩次的劑量。

#### 六、此藥儲存時的條件為何？

本品應儲存於室溫30°C以下乾燥之處。

\*本指導單張未收載藥品的資訊，若有任何疑問，請詢問您的醫師或藥師。

振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604