




神經退化改善劑：Exelon Patch 用藥指導單張





110.07.12 修訂
藥衛 097

學名	英文商品名	中文商品名	劑量	圖片
Rivastigmine	Exelon Patch	憶思能穿皮貼片	4.6mg/24hrs	

一、為什麼要使用這種藥？

憶思能穿皮貼片 (Exelon Patch)：用於治療輕度至中度阿滋海默型失智症。

二、如何使用這種藥？

 <p>① 沿著虛線剪開取出貼片。</p>	 <p>② 撕下在貼片一側的保護襯墊。</p>	 <p>③ 將有黏膠部分貼在乾燥、乾淨無毛髮處，如上背或下背、上臂或胸部。 再撕掉另一側保護襯墊。</p>	 <p>④ 用力壓住 30 秒鐘確實黏妥。 每 24 小時需更換新貼片，同一個部位 14 天內勿重複貼。</p>
---	---	--	--

三、使用期間該注意些什麼？

1. 貼片不可裁剪或折疊。
2. 手指不要碰到貼片的黏性面。
3. 勿將貼片貼在塗有乳霜，乳液或撲粉的皮膚上(會無法黏牢)。
4. 丟棄時，撕下貼片後請對摺放回原來包裝袋中再丟棄，並以肥皂和水洗手。
5. 洗澡、游泳、淋浴時不影響貼片，但不可長時間暴露在外部熱源(如：過度日曬、三溫暖、日光浴)。
6. 若貼片脫落，在這一天的剩餘時間要補上新的貼片，第二天則和以往相同時間換上新的貼片。

7. 若有需要，可用細字原子筆在貼片上寫字(如：日期)，幫助提醒移除貼片的時間。

四、可能引起的副作用？

1. 常見的不良反應包括噁心、嘔吐、腹瀉、食慾減退、體重減輕、混亂。
2. 胃腸道不良反應尤其容易發生在劑量調整期間。若持續不適，可先降回先前可耐受的劑量，並回診告訴醫師。
3. 使用貼片可能造成過敏性接觸性皮膚炎，若皮膚反應擴散超出貼片範圍，或症狀加劇(水腫、丘疹、水疱)，或撕下貼片後 48 小時未改善時，請停用並回診就醫。

五、忘記使用怎麼辦？

若您漏貼一劑或忘記更換您的貼片，請於記起時立刻貼上下一片貼片。請勿為了補貼而同時貼上 2 片貼片。

六、此藥儲存時的條件為何？

請密封存於 30°C 下，並避免陽光直射。

*本指導單張未收載藥品的資訊，若有任何疑問，請詢問您的醫師或藥師。

振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604