

# 拜瑞妥使用者須知

拜瑞妥® Xarelto®



請隨身攜帶本卡

接受任何醫師或牙醫師治療前，  
先出示本卡



我應該知道有關 拜瑞妥® Xarelto® 的哪些事？

- ◆ Xarelto® 有抗凝血作用，預防危險的血栓形成。醫師為您處方拜瑞妥以預防因心房纖維顫動而可能造成的中風與血栓發生。
- ✓ ◆ 必須確實依照醫師開立的處方服用Xarelto®。為了確保最佳預防血栓效果，切勿漏服任何一劑。
- ◆ 在沒有事先與醫師討論前，不得停用Xarelto®，因為可能增加您出現血栓的風險。
- ◆ 服用任何其他藥物前，請先向您的醫療照護提供者洽詢。
- ◆ 動任何手術或進行任何侵入性程序前，請先告知您的醫療照護提供者您正在服用Xarelto®。



Bayer



## 我何時應該徵詢醫療照護提供者的建議？

服用抗凝血劑，如Xarelto®時，您必須清楚它可能的副作用。出血是最常見的副作用。如果您有異常出血風險，請先與醫師討論後再開始服用Xarelto®。

如果您出現下列任何出血徵象或症狀，請立即告知您的醫療照護提供者：

- ◆ 疼痛
- ◆ 腫脹或不適
- ◆ 頭痛、頭暈或虛弱
- ◆ 異常瘀青、流鼻血、牙齦出血、傷口止血時間過長

- ◆ 月經來潮或陰道出血量異常增加
- ◆ 尿液呈粉紅或棕色，或糞便呈紅色或黑色
- ◆ 咳血或吐血，或吐出看似咖啡渣的物質



## 拜瑞妥®Xarelto® 如何服用？

- ◆ 為了確保最佳保護作用，Xarelto® 15 mg與20 mg必須搭配食物服用。

本用藥提醒須知僅限由處方醫師  
提供正在服用此藥物的患者

 **Xarelto®**  
rivaroxaban



本人目前正在接受Xarelto® (rivaroxaban) 的抗凝血治療

姓名/

地址/

生日/

體重/

血型/

其他藥物/情況



遇到緊急情況時，請通知：

醫師姓名/

醫師電話/

醫師簽章/



也請通知：

姓名/

電話/

與病患關係/



醫療照護提供者須知：

- ◆ 因為INR數值不是測量Xarelto® 抗凝血活性的可靠指標，所以不建議使用。