


## 普利馬林 Premarin 用藥指導單張

109.07.18 修訂  
藥衛 031

學名	英文商品名	中文商品名	劑量	圖片
Estrogen conjugated	Premarin	普利馬林	0.625mg/tab	

### 一、為什麼要使用這些藥？

女性因自然停經或手術所引起之女性荷爾蒙缺乏症狀的荷爾蒙替代療法。

### 二、如何使用這個藥？

通常每天服用或是一個循環：一天服用一次，服用 21 天然後休息 7 天，重複此循環。

### 三、使用期間該注意些什麼？

1. 懷孕禁用，如妳計畫準備懷孕，或在服藥期間已懷孕，就診時請務必告知醫師。
2. 若妳給嬰兒餵母乳，就診時請務必告知醫師。
3. 此藥可能會造成胃不舒服，服藥時最好併服食物或牛奶。
4. 如果服用本藥品是為了治療骨質疏鬆，請遵循飲食及運動建議，包括鈣質的補充。

### 四、可能引起的副作用？

噁心、嘔吐、腹部痙攣、頭痛、改變經期、浮腫、體重改變等現象。

### 五、忘記使用怎麼辦？

想起時立刻補服一次劑量，若是很接近下次服藥時間，則跳過一次，依原來時間服用下一次的劑量，絕不可一次服用兩倍藥量，並請告知醫師。

### 六、此藥儲存時的條件為何？

將藥物存放於能緊閉之容器中，並置於小孩子拿不到的地方。

\*本指導單張未收載藥品的資訊，若有任何疑問，請詢問您的醫師或藥師。

振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604