



# 標靶用藥指導單張

目前用藥(✓)	學名	商品名	中文商品名
	Aldesleukin	Proleukin	普留淨
	Bevacizumab	Avastin	癌思停
	Bortezomib	Velcade	萬科
	Cetuximab	Erbitux	爾必得舒
	Rituximab	Mabthera	莫須瘤
	Trastuzumab	Herceptin	賀癌平
	Pertuzumab	Perjeta	賀疾妥
	Ado-trastuzumab emtansine	Kadcyla	賀癌寧
	Aflibercept	Zaltrap	柔癌捕

## 一、使用期間該注意些什麼？

此類藥物於施打期間，只要出現輸注相關反應，如：發燒、寒顫、暈眩、呼吸困難、血管性水腫等，請立即告知臨床醫療人員。

普留淨：發生心律不整與血壓之改變時，請告知醫生。

癌思停：出現出血、嘔吐、胃腸穿孔、影響傷口癒合，須進一步追蹤。

萬科：當出現過敏、神經疼痛、皮膚顏色變黃、血便，請告知醫生。

爾必得舒：有心肺疾病患者，使用時要特別小心並定期追蹤。

莫須瘤：過敏、皮膚黏膜異常等症狀發生時，請就醫處置。

賀癌平：有心肺疾病患者，要特別小心並定期追蹤。

賀疾妥：針對具有生育能力的婦女，告知她們在治療期間及最後一劑治療後 6 個月內，使用有效的避孕措施。

賀癌寧：病患曾發生嚴重的肝臟毒性，也可能導致左心室射出率減少。

柔癌捕：可能引起嚴重出血，若有出血症狀，包括頭暈在內，請告知醫師。



## 二、可能引起的副作用：

\*副作用發生率：分別以 > 10% ●，1%~10% ⊙，<1% ○代表之

學名 (商品名)	感染	虛弱	噁心	腹瀉	皮膚 刺激	掉髮	腎功能 惡化	肝毒性	耳毒 性	口腔 炎	腹痛	出血	神經 病變
Aldesleukin (Proleukin <sup>®</sup> ) 普留淨	●	●	●	●	●		●				●	○	
Bevacizumab (Avastin <sup>®</sup> ) 癌思停	●	●	●	●	●	●	●	●		●	⊙	⊙	●
Bortezomib (Velcade <sup>®</sup> ) 萬科	○	●	●	●	●		○	●	○	●	●	⊙	●
Cetuximab (Erbix <sup>®</sup> ) 爾必得舒	●	⊙	⊙	⊙	●		○	⊙		●	●		
Rituximab (Mabthera <sup>®</sup> ) 莫須瘤	●	●	●	●	⊙		○	●			●		
Trastuzumab (Herceptin <sup>®</sup> ) 賀癌平	●		●	●	●		○	●		⊙	●		
Pertuzumab (Perjeta <sup>®</sup> ) 賀疾妥				●	●					●			
Ado-trastuzumab emtansine (Kadcyla <sup>®</sup> ) 賀癌寧	⊙	●	●	●	●			○					●
Aflibercept (Zaltrap <sup>®</sup> ) 柔癌捕	⊙	●					●	●		●	●	●	●

\*本指導單張未收載藥品的資訊，若有任何疑問，請詢問您的醫師或藥師。  
振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604 或 5605