




泰嘉錠 Tykerb 用藥指導單張

109.07.18 修訂
藥衛 017

學名	英文商品名	中文商品名	劑量	圖片
Lapatinib	Tykerb	泰嘉錠	250 毫克	

一、為什麼要使用這些藥？

與 Capecitabine (Xeloda；截瘤達)或芳香酶抑制劑合併治療腫瘤之後期或轉移性乳癌患者。

二、如何使用這個藥？

1. 請依照醫師指示按時服用，不可自行增減藥量或任意停藥。
2. 本藥應空腹使用(進食前一小時或進食後一小時)。
3. 醫師可能會依照您的個別狀況調整藥量，請確實依照醫師指示服用。

三、使用期間該注意些什麼？

1. 懷孕婦女使用本藥物會對腹中胎兒造成傷害。具有生育能力的婦女應採取適當的避孕措施；若您在服藥期間懷孕或準備懷孕，請告知您的醫師。
2. 服用本藥期間應停止餵哺母乳。
3. 若您曾有肝臟疾病、肺部疾病、心臟疾病或心臟節律問題、曾對此藥產生過敏，服用本藥前須先告知您的醫師。
4. 本藥可能會造成肝功能指數上升，請依照醫師指示，定期回診檢測肝功能。
5. 本藥品可能與其他藥品發生交互作用，如果您有同時服用其他藥品，請告知您的醫師以便評估。
6. 服用此藥期間，請勿食用葡萄柚或飲用葡萄柚汁。

四、可能引起的副作用？

1. 較常見：腹瀉、噁心、嘔吐、皮膚乾燥、四肢疼痛、背痛、失眠、掌足紅腫疼痛、口腔潰瘍或出現白點、消化不良、打嗝、腸胃不適或腹痛。

2. 較不常見：胸痛、呼吸困難、昏厥、心跳過速或不規律、嚴重腹瀉、呼吸短促、胸悶、喘鳴、不尋常的感到虛弱或疲倦。這些副作用發生時請立即就醫。

五、忘記使用怎麼辦？

若您忘了服藥，當想起來的時候趕快補服一次藥量。若已接近下次服藥的時間，就跳過忘記服用的劑量；不可同時服用兩倍的藥量。

六、此藥儲存時的條件為何？

室溫貯存(15~30°C之間)，避免過熱、潮濕以及光線直射。不可冷凍。

*本指導單張未收載藥品的資訊，若有任何疑問，請詢問您的醫師或藥師。

振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604