



淨菸經皮吸收戒菸貼片 Smokfree Tdds 用藥指導單張

109.07.18 修訂
藥衛 035

學名	英文商品名	中文商品名	劑量	圖片
Nicotine	Smokfree Tdds No.10	淨菸經皮吸收戒菸貼片 10 號	20.8mg/10cm ²	
Nicotine	Smokfree Tdds No.15	淨菸經皮吸收戒菸貼片 15 號	31.2mg/15cm ²	

一、為什麼要使用這些藥？

協助戒菸。

二、如何使用這個藥？

1. 將淨菸貼片從鋁箔袋中取出。
2. 撕開上角切痕處，取出方形膚色貼劑。
3. 用大拇指撥開膚色部分，然後用另一大拇指之力量撕開剝離透明塑膠襯墊。
4. 將膚色面向上，內面有黏膠部分貼在乾燥、乾淨無毛髮處，如手臂、胸口或腹部，用力壓住 10 秒鐘。每天使用時不要貼在已經貼過的部位。
5. 使用淨菸貼片 24 小時後，請取下貼劑對摺後丟棄。

三、使用期間該注意些什麼？

1. 孕婦不宜使用，以免傷害胎兒。
2. 當使用淨菸貼片時，絕對禁止吸菸，以免造成尼古丁過量而發生中毒現象。
3. 使用淨菸貼片不宜超過三個月，因為有可能因過長時間吸收貼劑中的尼古丁而造成對尼古丁成癮。
4. 使用淨菸貼片 24 小時之後，若發生紅腫（erythema）現象，請立即停止使用並與醫師討論。
5. 心臟病疾病患者，請由醫師認定及評估後，決定是否可使用淨菸貼片。

6. 使用戒菸貼劑偶有心跳加快的報導，若造成嚴重的心絞痛時，請即刻停止使用並與醫師討論。
7. 當使用完淨菸貼片後，必須將其對摺後丟棄，以免讓孩童拿去玩耍。
8. 因為尼古丁具揮發性，若打開後放置太久將失去其效力（strength），故由鋁箔袋中取出淨菸貼片後，需即刻使用。

四、可能引起的副作用？

皮膚紅腫或刺痛感之副作用，但在短時間內，此症狀即可消失。

五、忘記使用怎麼辦？

如果忘記用藥應立刻補用該次劑量。若是很接近下次用藥時間，則跳過該次劑量，依原來時間使用下一次的劑量，絕不可一次使用兩倍藥量，並請告知醫師。

六、此藥儲存時的條件為何？

請將儲存在攝氏25°C以下。本戒菸貼片若出現輕微的褪色情形，對貼劑品質無影響，請安心使用。切記，在夏天的太陽照射下，車內的溫度可能遠高於30°C。

*本指導單張未收載藥品的資訊，若有任何疑問，請詢問您的醫師或藥師。

振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604