




神經退化改善劑：Rivast Oral Solution 用藥指導單張









110.07.12 修訂
藥衛 096


學名	英文商品名	中文商品名	劑量	圖片
Rivastigmine	Rivast Oral Solution	理曼提內服液劑	240mg/120ml	

一、為什麼要使用這種藥？

理曼提內服液劑 (Rivast Oral Solution)：用於治療輕度至中度阿滋海默型失智症，或是與帕金森氏相關的輕度至中度失智症。

二、如何使用這種藥？

			
①檢查包裝套組(藥水、劑量管、底座及內塞吸管各一)。	②用力下壓並逆時鐘旋轉，打開安全瓶蓋。	③將吸管放到藥水瓶中用力塞入，使頂端與瓶口緊密貼合。	④將劑量管插入吸管中。
			
⑤吸取大於所需藥量之c.c.數。	⑥將劑量管倒置，將推桿下拉準備排氣。	⑦將劑量管推桿緩緩上推將氣體排除。	⑧將多餘的劑量緩緩排回藥水瓶中。



三、使用期間該注意些什麼？

1. 有心臟疾病、氣喘、阻塞性肺病的病人，需要小心使用。
2. 此藥可能會增加胃酸的分泌，也可能惡化尿道阻塞或癲癇發作，此類病人必須小心使用。

四、可能引起的副作用？

1. 常見的不良反應包括噁心、嘔吐、腹瀉、食慾減退、體重減輕、混亂。
2. 胃腸道不良反應尤其容易發生在劑量調整期間。若持續不適，可先降回先前可耐受的劑量，並回診告訴醫師。

五、忘記使用怎麼辦？

忘記用藥想起時應盡快補服。若已經接近下次用藥時間，不需補服請跳過一次，下次用藥時間依正常劑量服用，不能服用兩倍劑量。

六、此藥儲存時的條件為何？

請密封存於室溫 25°C 下，無須冰存並避免陽光直射。

*本指導單張未收載藥品的資訊，若有任何疑問，請詢問您的醫師或藥師。

振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604