




## 痘膚潤 Differin Gel 用藥指導單張

109.07.18 修訂  
藥衛 060

學名	英文商品名	中文商品名	劑量	圖片
Adapalene	Differin Gel	痘膚潤	0.1% 15g Tube	

### 一、為什麼要使用這些藥？

痘膚潤凝膠用於治療尋常性痤瘡。

### 二、如何使用這個藥？

1. 遵照醫師指示使用。建議每日一次睡前使用，於洗臉後施用於痤瘡患部；塗一層凝膠薄膜，且避開眼睛及嘴唇。
2. 患者使用痘膚潤後會把深層隱藏之粉刺排出到表皮，而讓患者覺得粉刺更多的情形，此為正常現象。

### 三、使用期間該注意些什麼？

1. 若出現過敏或嚴重刺激反應時，須停止用藥；若局部刺激程度增加時，應降低用藥頻次或暫時停藥。
2. 本藥品僅供外用，且不可接觸眼、口、鼻角或黏膜；勿用於破裂皮膚(有傷口)或濕疹性皮膚。
3. 孕婦及哺乳婦不建議使用。
4. 不建議與維生素 A 酸類同時使用；如使用化妝品，則化妝品須為非致粉刺性與非收斂性。
5. 應避免曝露於日光或紫外線下。

### 四、可能引起的副作用？

1. 可能使皮膚有刺激感。過量使用可能出現發紅、脫皮或刺癢、灼熱等不適感。
2. 此藥具輕度局部刺激性，因此不可同時使用剝脫劑、收斂劑或刺激性產品，避免增加其刺激性副作用。

## 五、忘記使用怎麼辦?

為避免用藥後過度曝露於日光或紫外光下，如果前一日睡前忘記塗藥，請於隔日睡前再塗藥即可；並不建議於白天睡醒後補塗藥品。

## 六、此藥儲存時的條件為何?

室溫貯存；請存放於兒童接觸不到的地方。

\*本指導單張未收載藥品的資訊，若有任何疑問，請詢問您的醫師或藥師。

振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604