


服用舒癌特(SUTENT®)方式

建議劑量

給藥劑量 每天口服50 mg

服藥時程 連續服用四週，休息二週

服藥方式 可空腹或與食物一起服用



劑量調整

劑量可依病患的副作用種類及嚴重程度，每次以一劑量等級(Dose Level)進行調整，最多調降兩級(劑量低於25mg可能無法達到有效治療濃度)。

劑量等級	每日劑量	由等級0調整	服用膠囊數
0	50mg	0	12.5mg CAP. X 4
-1	37.5mg	- 12.5mg	12.5mg CAP. X 3
-2	25mg	- 25mg	12.5mg CAP. X 2

若病患須進行大手術，至少應於手術前兩週停止服用舒癌特(SUTENT®)，並且在手術後兩週以後再開始繼續服藥。

根據治療引起的副作用進行劑量調整的建議請見下表

毒性	第1、2級	第3級	第4級
非血液學相關	維持相同劑量	暫停給藥直到毒性≤第1級或回覆到基礎值 然後維持相同劑量繼續給藥或者依醫師判斷調降1個劑量等級給藥*	然後調降1個劑量等級繼續給藥 或者依醫師判斷停止用藥*
血液學相關		暫停給藥直到毒性≤第2級或回覆到基礎值 然後維持相同劑量繼續給藥**	然後調降1個劑量等級繼續給藥*

* 發生grade 4 hypernatremia或grade 3 hypophosphatemia但沒有臨床症狀的病患可以在醫師判斷後不經停藥即繼續給藥。
Nausea, vomiting或diarrhea若經藥物治療仍維持在grade3或4的話，必須調降舒癌特(SUTENT®)劑量。

** 發生grade 3或4 lymphopenia的病患若無其他劑量限制事件(dose-limiting events, 例如有機性感染)，可以不經停藥即繼續給藥。

常見副作用及建議處理方式

使用舒癌特出現的不良反應通常較輕微為第一級或第二級，且可經由適當處理而緩解，常見副作用包括：疲倦(不分等級51%，第三級7%)、腹瀉(不分等級53%，第三級5%)、手足症候群(不分等級20%，第三級5%)

疲倦

發生時間 開始服藥後二至三週。

- 處理方式
1. 評估是否因藥物以外的原因所造成(如疼痛、憂鬱等)。
 2. 評估病患的甲狀腺功能是否正常並採取必要的藥物治療。
 3. 評估病患是否出現心臟衰竭之可能並採取必要之處置。
 4. 必要時可調整舒癌特(SUTENT®)的劑量。

腸胃症狀：腹瀉

發生時間 服藥後二至五天。

- 處理方式
1. 徵詢營養師的意見，適度地改變飲食型態。
 2. 補充水分及電解質以避免脫水。
 3. 使用增加糞便體積及抗腹瀉的物質改善糞便硬度並減低腸道蠕動頻率。
 4. 進食前30分鐘服用loperamide。

手足症候群

發生時間 可能在服藥後任何一個時間點出現。

- 處理方式
1. 可建議病患預防性使用潤膚乳液(含5-10% urea 效果更佳)，同時保持皮膚濕潤。
 2. 若出現水泡或潰瘍時可尋求皮膚科醫師的協助，適當地使用藥物緩解疼痛，如外用類固醇藥物。
 3. 若評估治療仍對病患有益處，可調整劑量，只有在相當嚴重且降低劑量或暫時性停藥都無法改善時才考慮終止治療。



Creel T, et al. JCO 2006; Wood LS. Community Oncology 2006;3:559-562