




紓癌特膠囊 Sunitinib 用藥指導單張

109.07.18 修訂
藥衛 015

學名	英文商品名	中文商品名	劑量	圖片
Sunitinib	Sutent	紓癌特膠囊	12.5 毫克	

一、為什麼要使用這些藥？

治療晚期腸胃道間質腫瘤，且已經使用過基利克錠 Glivec Tablet (Imatinib Mesylate) 治療的患者，或治療晚期腎細胞癌，或無法切除之胰臟神經內分泌腫瘤。

二、如何使用這個藥？

1. 請依照醫師指示按時服用。
2. 按照治療 4 週接著停藥 2 週的時間表給藥，勿自行增減藥量或任意停藥。
3. 可以隨餐服用亦可空腹服用。膠囊需整顆吞服，不可打開及嚼碎。

使用這些藥品，有那些情形該事先告知醫師

1. 提醒你的醫生過去曾經接受的其他化學或放射治療。若有其他疾病及正在服用的處方或非處方藥也請事先告知醫師。
2. 做任何手術前（包括牙科手術），請告知醫師，讓醫師知道您正服用此藥。
3. 如果同時使用 Warfarin，可能會增加出血的機會，須定期檢查凝血功能。
4. 若計劃準備懷孕時，請先告知醫生。

三、使用期間該注意些什麼？

1. 顯著之副作用有：白血球、紅血球、血小板減少，會增加感染及出血之危險機率，醫生會定時做血液檢查。因此請避免刀傷(例如刮鬍子、剪指甲)、意外碰撞造成瘀血或受傷；避免和有傳染性疾病病人接觸。
2. 請定期回診以確定療效並追蹤病情。絕不可與其他人分享此藥。
3. 當服用此藥時避免受孕。
4. 接受此藥品治療時應避免哺餵母乳。

四、可能引起的副作用？

1. 常見副作用包括：疲倦、腸胃道不適(噁心、嘔吐、便秘、食慾不振、腹瀉)、皮膚變黃乾燥增厚、手掌或腳掌起水泡、皮疹、刺激或味覺障礙、頭暈等。若有以上副作用請於回診時告知醫師。
2. 若發現血壓升高嚴重的腸胃不適、出血、高血壓、血尿、黑便或血便、咳嗽、喘鳴、呼吸困難(鬱血性心衰竭的可能症狀)卻無氣喘之診斷或病史、嚴重皮膚疹或臉部浮腫，排尿明顯減少或茶色尿、黃疸、上腹痛等。若有以上副作用請，請立即就醫。

五、忘記使用怎麼辦？

本藥需依時間表規律使用，如果真的忘了服藥，請儘快與您的醫師或藥師連絡。絕不可一次服用兩倍藥量。

六、此藥儲存時的條件為何？

儲存溫度 15-30°C，保持乾燥。小孩拿不到的地方。

*本指導單張未收載藥品的資訊，若有任何疑問，請詢問您的醫師或藥師。

振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604