




素女潔陰道用凝膠 Sutrol Vag Gel 用藥指導單張

109.07.18 修訂
藥衛 038

學名	英文商品名	中文商品名	劑量	圖片
Metronidazole	Sutrol Vag Gel	素女潔陰道用凝膠	0.75% 25gm Tube	

一、為什麼要使用這些藥？

治療陰道滴蟲等感染所引起之陰道炎、白帶。

二、如何使用這個藥？

1. 將施藥器旋轉固定於藥管上。
2. 再將藥品擠入施藥器中，至充滿為止。
3. 採坐姿或仰臥，握住施藥器外管，輕塞入陰道深處後，注入藥品
4. 使用後請以溫水清洗施藥管，切勿煮沸或使用熱水清洗。

三、使用期間該注意些什麼？

1. 易水腫病者或服用副腎皮質類固醇者，服用此藥時須特別注意。
2. 有血性惡液質病歷者，治療前及治療後須注意測量其白血球數量。
3. 與藥物接觸的東西(如：針、套管等)不可使用鋁製品。
4. 若需要再度治療，兩次療程間應間隔4~6星期。
5. 若是生殖道感染性伴侶應一併接受治療。

四、可能引起的副作用？

使用後皮膚可能發生暫時性發紅及皮膚輕微乾燥、灼熱感及刺激感。

五、忘記使用怎麼辦？

如果忘記用藥應立刻補用該次劑量。若是很接近下次用藥時間，則跳過該次劑量，依原來時間使用下一次的劑量，絕不可一次使用兩倍藥量，並請告知醫師。

六、此藥儲存時的條件為何？

室溫25°C以下，避光儲存。請在有效期限內使用。

*本指導單張未收載藥品的資訊，若有任何疑問，請詢問您的醫師或藥師。

振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604