




舒腹達 Smecta 用藥指導單張

109.07.18 修訂
藥衛 025

學名	英文商品名	中文商品名	劑量	圖片
Dioctahedral Smectite	Smecta	舒腹達	3gm/包	

一、為什麼要使用這些藥？

針對急性與慢性腹瀉之治療。

二、如何使用這個藥？

每包藥品可與 50 ml 水或半流質混合(如：肉湯、果汁、菜泥、嬰兒食品)。例如：處方 0.33 包 一天 3 次，以 60 毫升空瓶先加入 50 毫升水或半流質液體，將一包粉末倒入，混合均勻後，依次倒出 1/3 量服用。

三、使用期間該注意些什麼？

1. 假如症狀在連續服用七天後仍未改善，病患必需向醫師或藥師詢問。
2. 假如疼痛併有發燒或嘔吐的現象發生，則必需立即向醫師詢問。
3. 舒腹達並非補液治療，所以舒腹達不能替代補液療法，脫水病例應適當補充液體。
4. 本品的吸附作用可能干擾其他藥物的吸收與排除，應盡量避免與其他藥品同時使用，如需服用其他藥物，建議與舒腹達間隔一段時間。

四、可能引起的副作用？

少數個案有便秘之情形。

五、忘記使用怎麼辦？

想起時立刻補服一次劑量，若是很接近下次服藥時間，則跳過一次，依原來時間服用下一次的劑量，絕不可一次服用兩倍藥量，並請告知醫師。

六、此藥儲存時的條件為何？

存放於乾爽地方，不要超過盒上指明的日期。請擺放在遠離兒童的地方。

*本指導單張未收載藥品的資訊，若有任何疑問，請詢問您的醫師或藥師。

振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604