



艾瑞莎 Iressa 用藥指導單張

109.07.18 修訂
藥衛 016

學名	英文商品名	中文商品名	劑量	圖片
Gefitinib	Iressa	艾瑞莎	250 毫克	

一、為什麼要使用這些藥？

治療局部惡化或轉移之腺性非小細胞肺腺癌且基因突變之第一線用藥。

二、如何使用這個藥？

1. 請依照醫師指示按時服用，勿自行增減藥量或任意停藥。
2. 每日定時服藥一次，可隨食物或空腹使用。

三、使用期間該注意些什麼？

1. 服藥期間如果產生呼吸困難、咳嗽、發燒之症狀，請立即就醫。
2. 可能會產生無症狀的肝指數上升，須定期檢查肝功能。
3. 提醒你的醫生過去曾經接受的其他化學或放射治療。
4. 若有其他疾病(例如：肝、腎病)及正在服用的藥物、中草藥及保健食品等也請事先告知醫師。
5. 如果同時使用 Warfarin，可能會增加出血的機會，須定期檢查凝血功能。
6. 當服用此藥時避免受孕。若準備懷孕時，請告知醫生。接受此藥最好不要餵母乳。
7. 絶不可與其他人分享此藥。

四、可能引起的副作用？

1. 較常見：腹瀉，紅疹，粉刺，皮膚乾燥，噁心，嘔吐。
2. 常見：蕁麻疹，食慾不振，衰弱、口腔炎、無症狀的肝指數上升，間質性肺病。
3. 較少見：視覺遲鈍，結膜炎，呼吸困難。
4. 服用此藥物後如果產生新增之眼部症狀、嚴重或持續的噁心、嘔吐、腹瀉或食慾不振、或無法忍受之副作用，請立即就醫。

五、忘記使用怎麼辦？

想起時立刻補服一次劑量，若是很接近下次服藥時間，則跳過一次，依原來時間服用下一次的劑量，絕不可一次服用兩倍藥量，並請告知醫師。

六、此藥儲存時的條件為何？

儲存溫度不可超過 30°C。

*本指導單張未收載藥品的資訊，若有任何疑問，請詢問您的醫師或藥師。

振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604