



菲塔敏思 Ventavis 用藥指導單張

109.07.18 修訂
藥衛 041

學名	英文商品名	中文商品名	劑量	圖片
Iloprost trometamol	Ventavis Nebuliser Soln	菲塔敏思	20 mcg/2ml	 Ventavis 20mcg/2ml Nebuliser Soln 菲塔敏思

一、為什麼要使用這些藥？

原發性肺動脈高血壓。

二、如何使用這個藥？

- 每次吸用應該使用新的安瓿瓶，且使用適合本品且經驗證合格的霧化器。
- 在使用霧化器前，必須將安瓿瓶藥液快速地完全裝入霧化器中。
- 丟棄當次未用完的藥液。
- 應謹慎遵循霧化器製造商提供的霧化器衛生和清潔的指示。

三、使用期間該注意些什麼？

- 勿與皮膚、眼睛接觸，亦應避免將本品經口吞食。
- 霧化過程中，須避免使用面氣罩，只需使用吸嘴。
- 建議使用有濾膜或有吸入啟動系統的霧化器，並保持室內良好通風。
- 用藥期間若有症狀加重、呼吸困難，應立刻連絡護理師及主治醫師。

四、可能引起的副作用？

血管舒張、頭痛及咳嗽增多。

五、忘記使用怎麼辦？

想起時立刻補服一次劑量，若是很接近下次服藥時間，則跳過一次，依原來時間服用下一次的劑量，絕不可一次服用兩倍藥量，並請告知護理師及醫師並遵循醫師指示。

六、此藥儲存時的條件為何？

- 開封後未用完的藥液應丟棄。
- 儲存於30°C以下，並且將藥物放在兒童拿不到的地方。

*本指導單張未收載藥品的資訊，若有任何疑問，請詢問您的醫師或藥師。

振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604