




葆蓆人類乳突病毒第 16/18 型疫苗用藥指導單張

109.07.18 修訂
藥衛 055

學名	英文商品名	中文商品名	劑量	圖片
Human Papillomavirus Type 16&18 Protein	Cervarix	葆蓆人類乳突病毒第 16/18 型疫苗	0.5ml Syringe	

一、為什麼要使用這些藥？

此疫苗適用於 10 歲至 25 歲之女性，預防致癌性人類乳突病毒(HPV)第 16 及 18 型引起之偶發性及持續性感染、相關之子宮癌前病變與子宮頸癌。

二、如何使用這個藥？

1. 請由醫師評估及指示，由醫療人員施打。
2. 葆蓆人類乳突病毒疫苗應以肌肉注射的方式施打於上臂三角肌部位。在任何情況下都不可以靜脈注射或皮內注射的方式施打葆蓆人類乳突病毒疫苗。
3. 本疫苗之建議接種時程為第 0、1、6 個月。

三、使用期間該注意些什麼？

1. 曾對此疫苗成分及賦型劑過敏的病患不適合使用。
2. 有嚴重發燒性疾病的患者應延後施打此疫苗。
3. 接種疫苗不能取代定期篩檢，也不能取代預防接觸 HPV 及性傳染病的措施，因此配合定期的子宮頸篩檢非常重要。
4. 懷孕的婦女與已經罹患子宮頸癌的婦女不建議施打 HPV 疫苗。
5. 施打此疫苗前，如果患有血小板減少症或任何出血性疾病需告知醫師。
6. 禁忌症：對本疫苗的活性成分或任何賦形劑過敏者。有急性嚴重發燒性疾病的患者應延後施打葆蓆人類乳突病毒疫苗。但若只是出現像感冒這類的輕度感染，則非接種疫苗的禁忌症。

四、可能引起的副作用？

1. 最常出現的是注射部位疼痛。
2. 噁心、嘔吐、腹瀉、頭痛、皮膚過敏及發燒 ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) 的副作用，若情況嚴重或持續發生，應告知醫師。
3. 在完整的三劑疫苗接種程序中，有 78%於施打之後發生此類反應。這些反應大部份都是輕至中度的反應，且持續時間並不長。

五、忘記使用怎麼辦?

請回診與醫師討論。

六、此藥儲存時的條件為何?

請貯存於冰箱中($2^{\circ}\text{C} - 8^{\circ}\text{C}$)。切勿冷凍。為避免光線照射，請置於原裝外盒中貯存。

*本指導單張未收載藥品的資訊，若有任何疑問，請詢問您的醫師或藥師。

振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604