


## 諾莉娜錠 Norina 用藥指導單張

109.07.18 修訂  
藥衛 029

學名	英文商品名	中文商品名	劑量	圖片
Norethisterone Acetate	Norina	諾莉娜錠	5mg/tab	

### 一、為什麼要使用這些藥？

須黃體荷爾蒙治療之婦科疾患，機能不全性子宮出血及其復發之預防。

### 二、如何使用這個藥？

本品應以適量液體整粒吞服，請依醫囑指示服用本藥品。

### 三、使用期間該注意些什麼？

- 於使用期間首次發生偏頭痛或經常發生不尋常的嚴重頭痛、出現血栓栓塞症狀的初期表徵、胸部疼痛緊繃應立即停藥並回診就醫。
- 手術前六週、臥床、開始有黃疸、開始有無黃疸性肝炎、全身發癢、血壓顯著升高、懷孕應立即停藥並回診就醫。
- 罹患糖尿病的患者必須進行嚴格的醫療監督。

### 四、可能引起的副作用？

子宮點狀出血、月經量減少、頭痛、噁心、水腫等。

### 五、忘記使用怎麼辦？

想起時立刻補服一次劑量，若是很接近下次服藥時間，則跳過一次，依原來時間服用下一次劑量，絕不可一次服用兩倍藥量，並請告知醫師。

### 六、此藥儲存時的條件為何？

請保存於25°C及兒童伸手不及之處。

\*本指導單張未收載藥品的資訊，若有任何疑問，請詢問您的醫師或藥師。

振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604