



諾雷德 Zoladex Depot Syringe 用藥指導單張

109.07.18 修訂
藥衛 045

學名	英文商品名	中文商品名	劑量	圖片
Goserelin	Zoladex Depot Syringe	諾雷德	3.6 mg	

一、為什麼要使用這些藥？

- 嚴重攝護腺癌之輔助治療。
- 停經前或更年期婦女之乳癌治療。
- 子宮內膜異位之治療。
- 手術前薄化子宮內膜及縮小子宮肌瘤。
- 人工協助生殖。

二、如何使用這個藥？

- 須由處方者監督下使用。
- 使用前，請檢查封裝袋未受損才可使用。
- 開封後需立即使用。
- 針筒必須丟棄於合格之針頭回收處理單位。

三、使用期間該注意些什麼？

- 注射部位偶有輕微瘀血。
- 未停經婦女，可能會造成假性停經，一旦停藥副作用即會改善。
- 可補充鈣質高的牛奶、小魚乾等食物避免骨質疏鬆。

四、可能引起的副作用？

腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐等。

五、此藥儲存時的條件為何？

儲存於 25°C 以下，勿陽光直射，無須放置冰箱。

*本指導單張未收載藥品的資訊，若有任何疑問，請詢問您的醫師或藥師。

振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604