



諾雷德持續性注射劑 Zoladex LA Syringe 用藥指導單張

109.07.18 修訂
藥衛 046

學名	英文商品名	中文商品名	劑量	圖片
Goserelin	Zoladex LA Syringe	諾雷德持續性注射劑	10.8 mg	

一、為什麼要使用這些藥？

用於攝護腺癌。

二、如何使用這個藥？

- 須由處方者監督下使用。
- 使用前，請檢查封裝袋未受損才可使用。
- 開封後需立即使用。
- 針筒必須丟棄於合格之針頭回收處理單位。

三、使用期間該注意些什麼？

- 注射部位偶有輕微瘀血。
- 未停經婦女，可能會造成假性停經，一旦停藥副作用即會改善。
- 可補充鈣質高的牛奶、小魚乾等食物避免骨質疏鬆

四、可能引起的副作用？

脹氣、腹脹、腹瀉等症狀，若您的症狀持續或加劇時請先停藥並請教醫師。

五、此藥儲存時的條件為何？

想起時立刻補服一次劑量，若是很接近下次服藥時間，則跳過一次，依原來時間服用下一次的劑量，絕不可一次服用兩倍藥量，並請告知醫師。

*本指導單張未收載藥品的資訊，若有任何疑問，請詢問您的醫師或藥師。

振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604