




## 口服 B 肝用藥指導單張

110.07.12 製訂

藥衛 099

學名	英文商品名	中文商品名	劑量	圖片
Entecavir	Baraclude	貝樂克 膜衣錠	0.5mg	
			1mg	
Tenofovir disoproxil	Viread	惠立妥 膜衣錠	300mg	
Tenofovir alafenamide	Vemlidy	韋立得 膜衣錠	25mg	
Lamivudine	Zeffix	千安能 錠劑	100mg	

## 一、為什麼要使用這些藥？

成人慢性B型肝炎。

## 二、如何使用這個藥？

藥品名稱	服藥時間
貝樂克	應空腹服用(飯前 2 小時或飯後至少 2 小時)。
惠立妥	每天一次，毋須理會進食時間，可單獨或與食物一起服用。
千安能	
韋立得	每天一次，隨食物口服。

### 三、使用期間該注意些什麼？

1. 停用抗 B 型肝炎藥物，可能會導致 B 型肝炎嚴重急性惡化，治療期間不可自行停藥，須依醫師處方完成療程。
2. 完成療程後，仍應定期回診進行臨床與抽血檢驗及影像學檢查追蹤。
3. 請告知醫師正在使用的其他藥物或保健食品。
4. 若有計畫懷孕、已懷孕或哺乳，應告知醫師。
5. 若有腎臟疾病、肝臟疾病或曾經做過肝臟移植，應告知醫師。

### 四、可能引起的副作用？

疲倦、頭痛、腹瀉、噁心、脹氣、消化不良、腸胃不適

### 五、忘記使用怎麼辦？

想起時盡快補服。若已接近下次服藥時間，則不須補服，按原本時間服用下次劑量。千萬不可一次服用兩倍的劑量。

### 六、此藥儲存時的條件為何？

請存放在 30°C 以下的乾燥陰涼處。

\*本指導單張未收載藥品的資訊，若有任何疑問，請詢問您的醫師或藥師。

振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604