


## 過乳降 Dostinex 用藥指導單張

109.07.18 修訂  
藥衛 061

學名	英文商品名	中文商品名	劑量	圖片
Cabergoline	Dostinex	過乳降錠劑	0.5mg Tab	

### 一、為什麼要使用這些藥？

產後斷奶，停止哺乳，或治療高乳促素血症。

### 二、如何使用這個藥？

1. 口服藥，宜與食物併服(建議在餐中服用)。
2. 若為產後斷奶在分娩後第一天服用 2 粒；若想要停止哺乳則每 12 小時服用半粒，連續服用 2 天。治療高乳促素血症通常每週服用一次或兩次(如：每週一或每週一和四)。
3. 必須遵醫囑常規服藥，不可自行更改劑量或自行停藥。

### 三、使用期間該注意些什麼？

1. 治療期間應避免懷孕與授乳。若發現懷孕應立即停藥，並與妳的醫師聯絡。
2. 子癲前症、或產後高血壓的婦女，不建議使用。
3. 由於可能引起眩暈，因此駕駛或操作機器時應特別小心。
4. 長期服用本藥品，應接受例行性婦科檢查。

### 四、可能引起的副作用？

噁心、頭痛、血壓降低、眩暈、失眠、腹痛。

### 五、忘記使用怎麼辦？

立即服藥。但如果已相當接近服用下一個劑量的時間，則應詢問您的醫生，再決定是否需要服用雙倍劑量。

### 六、此藥儲存時的條件為何？

室溫下緊密容器儲存。避免直接日照、熱、和溼氣。

\*本指導單張未收載藥品的資訊，若有任何疑問，請詢問您的醫師或藥師。

振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604