



學名	英文商品名	中文商品名	劑量	圖片
Rivaroxaban	Xarelto	拜瑞妥	2.5 毫克	
			10 毫克	
			15 毫克	
			20 毫克	
Dabigatran	Pradaxa	普栓達	110 毫克	
			150 毫克	
Apixaban	Eliquis	艾必克凝	5 毫克	
			2.5 毫克	
Edoxaban	Lixiana	里先安	30 毫克	
			60 毫克	

## 一、為什麼要使用這些藥？

	拜瑞妥	普栓達	艾必克凝	里先安
預防非瓣膜性心房纖維顫動病患發生中風與全身性栓塞*	V	V	V	V
預防其於接受下肢重大骨科手術後之靜脈血栓栓塞症	V	V		
預防深靜脈血栓與肺栓塞復發	V	V	V	
治療深靜脈血栓與肺栓塞	V	V	V	V

\*危險因子包括：(1)曾發生腦中風或短暫性腦缺血發作，(2)心衰竭，(3)75歲以上，(4)65歲以上未滿75歲且合併有糖尿病、高血壓或冠狀動脈疾病。

## 二、使用這些藥品，有那些情形該事先告知醫師？

1. 如果您曾經對此藥物或賦形劑過敏者。
2. 如果曾有消化性潰瘍病史或使用其他抗凝血劑、抗血小板藥物、消炎止痛藥者，或是有相關出血癥兆者如：牙齦滲血、皮膚瘀青、血尿等。
3. 肝、腎功能不佳者。
4. 任何手術或拔牙前，請告知醫師或牙醫師正在接受服用本藥。
5. 孕婦或有計畫懷孕的婦女在使用此藥前一定要告知醫師。

## 三、使用期間該注意些什麼？

藥名	注意事項
拜瑞妥	此藥物含有乳糖，對於乳糖不耐症者不應使用。
普栓達	不能將其膠囊弄破、咀嚼或打開，須整粒吞服。
拜瑞妥 普栓達 艾必克凝 里先安	進行任何外科手術或處置前，應先向原處方醫師諮詢，確認是否停藥及停藥天數，以確保用藥安全。

## 四、可能引起的副作用？

藥名	副作用
拜瑞妥	貧血、胃腸不適、腹瀉、便秘、胃腸道出血、瘀青、鼻出血等。
普栓達	消化不良(包括上腹部疼痛、腹部不適等)、腸胃潰瘍、食道炎、有增加出血之機率。
艾必克凝	過敏反應(包括藥物過敏，如皮疹，以及過敏性反應，如過敏性水腫)及暈厥。
里先安	噁心、皮疹、搔癢、貧血、流鼻血、胃腸道出血、皮膚軟組織出血、肝功能檢驗值異常。
若症狀嚴重且持續未改善，請告知醫師或藥師！	

## 五、忘記使用怎麼辦？

想起時，於同一天內立即服用；若已接近或已到下一次的服藥時間，只須服用下一次劑量，絕不可一次服用雙倍藥量。

\*本指導單張未收載藥品的全部資訊，若有任何疑問，請詢問您的醫師或藥師。

振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604