


## Colasa Enema 2gm/100ml 病人使用須知：

1. 使用前，先把浣腸劑置於溫水中約 10 分鐘使其接近體溫之溫度。
2. 插入浣腸劑前，先將之震搖均勻。
3. 除非經醫師特別指示，否則浣腸劑需睡前給予。
4. 打開瓶蓋後，將所附插管插在瓶口上。
5. 請用少許凡士林塗抹在浣腸劑之插管上。
6. 請採取下列側臥姿勢投予本浣腸劑：



左側側臥，左腳伸直，右腳彎曲。

7. 輕輕地將浣腸劑的插管塞入肛門，並推進至瓶蓋口為止。
8. 將藥液慢慢地完全擠進肛門內(至少 1 分鐘)。
9. 確定藥液完全灌入後，將藥瓶保持完全擠壓之現狀下拔出，並連瓶丟棄之。
10. 為確保浣腸劑能滯留體內，病人應維持相同姿勢 5~10 分鐘。然後可以平常姿勢睡覺，盡量不去大便直到第二天早上。

### 注意事項：

為避免藥品懸浮液因乾涸而於瓶蓋上呈現棕褐色之結塊，建議：

存放時盡量瓶口朝上直立，可避免結塊形成。

開蓋時若有棕色結塊掉落，可取出並搖勻後再使用。

瓶口微量結塊屬正常現象不影響產品品質，請放心使用。