



## 毛地黃 Digoxin 用藥指導單張

109.07.18 修訂  
藥衛 073

學名	英文商品名	中文商品名	劑量	圖片
Digoxin	Cardiacin Elixir	地高新 醃劑	每 1c.c. 含 0.05 mg	
Digoxin	Lanoxin	隆我心 錠劑	0.25 mg	

**一、為什麼要使用這些藥？**

用於治療心臟衰竭、心房撲動、心房纖維性顫動、陣發性心室性心搏過速。

**二、如何使用這個藥？**

請您遵照醫師處方的藥量、用法及時間服用。地高新醃劑附有滴管，以利精確汲取所需劑量。

**三、使用期間該注意些什麼？**

1. 請告知醫師您的過去病史及藥品過敏史，尤其是曾對毛地黃過敏者。
2. 請告訴醫師您目前正使用之藥品（包括處方藥、成藥及健康食品），尤其是制酸劑（俗稱胃藥）、抗生素、鈣片、類固醇、利尿劑、甲狀腺藥或其他心臟藥。
3. 孕婦或有計畫懷孕的婦女，在使用此藥前，請告知您的醫師。
4. 毛地黃劑量過高時，初期症狀包括厭食、噁心、嘔吐、腹瀉或視力改變等。若服藥期間，持續出現以上症狀，請告知醫師或至急診確認。
5. 旅行前，請您確定備有足夠的藥量。
6. 請勿將您的藥品與他人分享。

**四、可能引起的副作用？**

腸胃不適、嘔吐、腹瀉、食慾不振、頭痛、暈眩、頭昏眼花、視覺改變（視力模糊、黃色視覺）、皮疹、心搏動不規則。

## 五、忘記使用怎麼辦?

當想起時，應立即補服一次劑量。如果非常接近下次劑量的服藥時間，請您不要再補服忘記的劑量，只須照正常服藥的時間服用即可，切記不可一次服二倍劑量。

## 六、此藥儲存時的條件為何?

請您將藥物儲存於室溫下，遠離濕氣及陽光照射。藥物應儘量保存於原包裝或緊閉容器中，且須放於小孩拿不到的地方，以免誤食造成危險。

\*本指導單張未收載藥品的資訊，若有任何疑問，請詢問您的醫師或藥師。

振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604