

# 如何有效降低手術後感染的風險呢？

## 2% CHG 殺菌澡

使用含2% Chlorhexidine的洗劑

術前2% 殺菌澡為控制感染的第一道防線

安全 + 溫和 + 有效 降低全身菌落數

持續殺菌效力、有效抵抗細菌

CDC 建議術前必須執行殺菌藥澡

### 術前 2% Chlorhexidine 殺菌澡建議使用流程



1. 身體淋濕後，請直接使用2% CHG潔淨液，由下巴以下頸部開始至全身(由上往下)搓揉出泡。(請勿直接使用於臉部)



2. 稍加用力搓洗身體，並加強皺褶易出汗部位。(如腋窩、胯下)



3. 持續將2% CHG潔淨液塗抹於身體後背部(由上往下)。(請遵循醫護人員教育加強特定部位之清洗)



4. 確認身體皆有接觸2% CHG潔淨液後，需停留至少30秒後才可沖洗。



5. 請以清水沖洗乾淨。



6. 沖洗完畢後，使用乾淨的浴巾擦乾並換上乾淨的衣物。(請勿再塗抹乳液等物品)



# 注意事項

1. 請用一般清潔用品洗臉及洗頭髮後，下巴以下再用潔淨液清洗全身(最後一道)。
2. 請勿將潔淨液加水稀釋再塗抹(可能會影響效果)。
3. 不建議將潔淨液倒在洗澡巾或海綿上擦拭(因這些物品清潔度可能亦會影響效果)。