




康賜爾 Konsyl 用藥指導單張

109.07.18 修訂
藥衛 052

學名	英文商品名	中文商品名	劑量	圖片
Psyllium	Konsyl	康賜爾	6 克	

一、為什麼要使用這些藥？

可幫助軟便、調節排便正常。

二、如何使用這個藥？

每天服用 1~3 次，飯前、飯後或睡前依照醫師指示服用。

使用方法：

1. 一小包(6gm)公克放於一杯 8oz(240cc)液體中(果汁、一般飲料或水中)，冷液體可幫助混合。
2. 使完全均勻調和。
3. 完全混合後立刻喝下，並追加一杯冷開水增加藥效。

三、使用期間該注意些什麼？

1. 應儘量以含纖維飲食、充份攝取水份及運動來改善便秘。
2. 使用時須依指示加足量水服用。

四、可能引起的副作用？

胃腸道阻塞，脹氣，腹痛，有腹痛不適須詢問醫師。

五、忘記使用怎麼辦？

想起時立刻補服一次劑量，若是很接近下次服藥時間，則跳過一次，依原來時間服用下一次的劑量，絕不可一次服用兩倍藥量，並請告知醫師。

六、此藥儲存時的條件為何？

貯存在室溫、陰涼乾燥、兒童無法拿到之處，避免潮濕、陽光直射。

*本指導單張未收載藥品的資訊，若有任何疑問，請詢問您的醫師或藥師。

振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604