



抗結核病藥物使用須知

109.11.19 修訂
藥衛 003

目前常用的抗結核病用藥包括：異菸鹼醯肼錠、立復黴素膠囊、敵癆新邁錠及易復癆錠四種。通常需同時數種併用以降低結核菌產生抗藥性之機會並增加結核病之治癒率，其一般治癒率皆可達95%以上。

治療期間請勿自行停藥，若有身體不舒服時，您可以立即回診或聯絡醫師、護理師或藥師協助處理。在治療的過程中，醫師有可能將其中的藥物換成其他種藥物；而替代的藥物不影響結核病的治療效果。因此，治療期間若有任何疑惑或不適請您隨時告知。

一、如何服用？

1. 請遵照醫師指示之劑量及用法。
2. 為方便記憶，請固定時間服用藥物。
3. 在未經醫師指示或同意前絕不可停藥或改變藥量，以免結核病復發。

二、服藥期間應注意的事項？

1. 請主動告知醫師您目前或即將使用的藥物、健康食品及中草藥。若需要服用其他藥物前，請先諮詢您的醫師或藥師。
2. 結核病治療期間請勿飲酒，可能會造成肝毒性或幻覺等副作用。
3. 請您務必配合醫師進行相關檢查（如：監測肝功能或視力檢查）。
4. 服用這類藥物後可能讓您感覺頭昏、嗜睡等，在未確認藥物對您的影響前，請盡量避免從事開車、操作機械工作等。
5. 抗結核藥物之副作用大多數對身體影響不大，是安全的。但也有個別情況出現比較嚴重之症狀，所以在使用藥物過程中若您發生下述狀況時請立即回診就醫：
 - (1) 嚴重皮膚紅疹、臉部、咽喉或口唇腫脹或潰瘍。
 - (2) 黃疸（眼睛或皮膚發黃）、嚴重胃痛、噁心嘔吐。
 - (3) 呼吸困難、視覺明顯惡化及關節腫脹或疼痛等。
6. 若您發現忘記服藥，請盡快補服。





三、孕婦、哺乳應注意事項？

1. 大部份抗結核藥物可以使用於孕婦及授乳婦。
2. 接受第一線抗結核藥物治療的母親在初期兩週時，為避免傳染給嬰兒，可給予瓶授乳，乳汁中結核藥物濃度不致影響嬰兒健康。

四、抗結核病藥物藥品及可能之副作用

藥名/劑量	圖片	常見副作用
Isoniazid (Isonicotinyl Hydrazine) 異菸鹼醯肼錠 100 毫克		肝指數上升、四肢末端麻木或刺痛感、發熱、皮疹及腸胃道不適等。
Rifampicin 立汎黴素膠囊 300 毫克		尿液、咳痰或眼淚會呈現橘紅色，並不會造成身體傷害。 食慾不振、噁心、胃痛及肝指數上升、疲倦或有感冒症狀如發熱、皮膚紅疹及搔癢等。
Rifampin 利肺寧膠囊 450 毫克		肝指數上升、高尿酸血症或關節痛等。痛風患者需注意痛風發作。
Pyrazinamide 敵癆新邁錠 500 毫克		肝指數上升、高尿酸血症或關節痛等。痛風患者需注意痛風發作。
Epbutol 易復癆錠 400 毫克		食慾不振、噁心、胃痛、視神經炎、皮膚疹等。
Mycobutin 淨核膠囊 150 毫克		尿液、咳痰或眼淚會呈現橘紅色，並不會造成身體傷害。 皮疹、搔癢、腸胃不適、關節疼痛等。
Acemycin 時欣黴素注射液500毫克		注射處疼痛、暈眩、聽力障礙及腎功能下降等。
Avelox 威洛速膜衣錠400毫克		噁心、腹痛及腸胃不適、身體倦怠、頭痛、頭暈等。不可與胃藥或牛奶併服。

藥名/劑量	圖片	常見副作用
複方藥品：為減少服藥的顆數及方便吞服		

<p>AkuriT-4 立剋核膜衣錠 (Isoniazid + Rifampicin + Pyrazinamide + Eambutol)</p>	<p>AkuriT-4 275/75/400/150 Tab 立剋核-4 膜衣錠</p> 	<p>詳見異菸鹼醯肼錠、立復黴素膠囊、 敵癆新邁錠及易復癆錠。</p>
<p>AkuriT-3 立剋核膜衣錠 (Isoniazid + Rifampicin + Pyrazinamide)</p>	<p>AkuriT-3 275/75/150 Tab 立剋核膜衣錠</p> 	<p>詳見異菸鹼醯肼錠、立復黴素膠囊、 敵癆新邁錠。</p>
<p>RIFINAH 300 樂肺寧 300 (Isoniazid + Rifampicin)</p>	<p>RIFINAH 樂肺寧 300 糖衣錠</p> 	<p>詳見異菸鹼醯肼錠及立復黴素膠囊。</p>
<p>RIFINAH 150 樂肺寧 150 (Isoniazid + Rifampicin)</p>	<p>RIFINAH 150mg Tab 樂肺寧糖衣錠</p> 	

*本指導單張未收載藥品的資訊，若有任何疑問，請詢問您的醫師或藥師。

振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604