



拓撲異構酶抑制劑類用藥指導單張

109.07.18 修訂
藥衛 082

目前用藥(v)	學名	商品名	中文商品名
	Etoposide	Fytosid	癌妥滅
	Irinotecan	Campto	抗癌妥
	Irinotecan	Irino	益立諾
	Topotecan	Hycamtin	癌康定

一、使用期間該注意些什麼？

1. 若您有要施打任何疫苗（如：麻疹或流行感冒疫苗）或牙科處置時，請先告知您的醫師。
2. 治療期間容易感染，需勤洗手、盡量減少出入公共場所及預防感冒。
3. 使用抗癌妥可能引起腹瀉、流鼻水/眼淚、眩暈或視力障礙等。嚴重腹瀉可能導致脫水，請適時補充水份與電解質。
4. 若有下述症狀：疲倦感持續或加重、持續腹瀉、不尋常的挫傷或出血；頭暈、注意力不集中或頭昏眼花的感覺；呼吸急促/不適、咳嗽、發燒、寒顫、喉嚨痛；皮疹、搔癢、小便頻繁、血尿；注射部位疼痛、下腹部脹、臉及下肢腫脹等，請立即就醫。
5. 可能干擾女性的月經週期以及可能會影響男性精子產生，也可能會傷害胎兒，若在接受化療期間或化療之後計畫懷孕，請向您的醫師做進一步的諮詢，必要時確實做好避孕措施以避免懷孕。

二、可能引起的副作用？

*副作用發生率:分別以> 10% ●, 1%~10% ⊙, <1% ○代表之

學名 (商品名)	感染	虛弱	噁心	腹瀉	皮膚刺激	掉髮	腎功能惡化	肝毒性	耳毒性	口腔炎	腹痛	出血	神經毒
Etoposide (Fytosid [®]) 癌妥滅		○	●	●	○	●		⊙		⊙	⊙		○
Irinotecan (Campto [®]) 抗癌妥	●	●	●	●	●	●	○	●		●	●	⊙	

*副作用發生率:分別以> 10% ●, 1%~10% ⊙, <1% ○代表之

學名 (商品名)	感染	虛弱	噁心	腹瀉	皮膚刺激	掉髮	腎功能惡化	肝毒性	耳毒性	口腔炎	腹痛	出血	神經毒
Irinotecan (Irinol [®]) 益立諾	●	●	●	●	●	●	○	●		●	●	⊙	
Topotecan (Hycamtin [®]) 癌康定	●	●	●	●	●	●		⊙		○	●	○	

*本指導單張未收載藥品的資訊，若有任何疑問，請詢問您的醫師或藥師。

振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604