



## 肺炎鏈球菌疫苗介紹

109.09.14 制訂  
藥衛 094

肺炎鏈球菌是引發肺炎常見的細菌。肺炎鏈球菌潛伏在人類鼻腔內，當感冒或免疫力降低，肺炎鏈球菌可從呼吸道或血液入侵體內，輕微的症狀如中耳炎、鼻竇炎等，嚴重則會造成肺炎、敗血症、腦膜炎、骨髓炎、心包膜炎、溶血性尿毒症、腹膜炎等有生命危險。因此藉由肺炎鏈球菌疫苗可以有效預防感染發生。

### 肺炎鏈球菌疫苗種類




肺炎鏈球菌疫苗是一種不活化疫苗。有 13 價結合型 (PCV13) 疫苗及 23 價多醣體 (PPV23) 疫苗 2 種，可與其感冒疫苗分開不同部位同時接種。疾病管制署建議若是第一次施打建議施打 13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗。

### 副作用

常見副作用：注射部位可能產生輕微紅、腫、熱、痛的反應，一般在 2 天內恢復。約 0.8%-1% 民眾可能出現較嚴重的副作用，如有持續發燒、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩昏、心跳加速等不適症狀，應儘速就醫。

### 施打建議



對象	施打方式
50 歲以上慢性病患者	自費施打 1 劑 PCV13，最好隔 1 年再施打 PPV23。
50 歲以上免疫力低下者、癌症患者或合併慢性病患	自費施打 1 劑 PCV13，2 個月後再施打一次 PPV23。
65 歲以上建康長者	自費施打 1 劑 PCV13，最好隔 1 年再施打 PPV23。

資料來源：黃立民、林志學、馮嘉毅醫師  
製表：蔡怡真 ■ 聯合報



本指導單張未收載藥品的資訊，若有任何疑問，請詢問您的醫師或藥師。  
振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604