

注意事項



使用前用力搖勻鼻噴劑



緊實地按壓按鈕一口氣到底，如果按鈕難以用拇指按壓，您可以改用食指、中指和無名指同時按壓



每次用完後請擦式噴嘴和蓋子裡面



請勿在噴嘴上使用針或尖銳物品清潔



用完後立即蓋回蓋子，以防染塵、保持瓶內的氣壓，並防止噴嘴堵塞

Avamys™
fluticasone furoate

操作方便



噴出量是其他類固醇鼻噴劑的一半



不太會流入喉嚨或流出鼻孔



無氣味，幾乎沒有殘留味



GloaxSmithKline

荷商葛蘭素史克藥廠(股)公司台灣分公司

台北市忠孝西路一段65號2樓 電話：02-2381-8566 傳真：02-23120812 網址：www.gsk.tw

衛署藥輸字第024877號 本藥品需要由醫師處方使用

TW/FF/0004/13-JAN2013

Avamys™
nasal spray suspension
27.5 micrograms/spray

病患使用說明

fluticasone furoate

120

sprays

本單張僅限由醫護人員
提供予使用本產品之病患衛教使用

如何預備艾敏釋



以下情況您必須進行準備鼻噴劑程序：

- 首次使用噴霧劑前
- 蓋子曾經沒有蓋回

鼻噴劑的準備程序能確保您每次都能得到完整的藥物劑量。請依下列步驟進行：

1. 蓋回蓋子，並將鼻噴劑用力搖勻大約十秒鐘。



2. 用拇指和食指輕輕夾著蓋子兩邊，直立取下蓋子



3. 垂直拿著鼻噴劑，並把噴嘴向外



4. 緊實地按壓按鈕一口氣到底，並重覆至少 6 次直到空中出現一團微細的噴霧

如何使用艾敏釋



1. 用力搖勻鼻噴劑



2. 取下蓋子



3. 擣清鼻孔，然後頭稍微向前傾



4. 垂直拿著鼻噴劑，將噴嘴小心地放進其中一邊鼻孔



5. 將噴嘴末端稍微向外，離開鼻中隔。這有助藥物達到鼻孔內正確部位



6. 用鼻吸氣時，請緊實地按壓按鈕一口氣到底



7. 小心不要讓藥物噴進眼睛。如果發生這種情況，請用清水沖洗眼睛

8. 移出噴嘴，並用口呼氣

9. 如果您的醫生告訴您，每邊鼻孔必須噴兩次的話，重覆步驟 4 至 6

10. 噴藥於另一邊鼻孔時，亦請重覆步驟 4 至 6

11. 把蓋子蓋回鼻噴劑

如何清潔艾敏釋



每次使用完畢：

- 請用乾淨的乾紙巾來擦拭噴嘴和蓋子內面。請勿用水來清潔



- 請勿使用別針或任何利器在噴嘴上
- 清潔完畢請立即蓋回蓋子，以防塵、保持瓶內的壓力，並防止噴嘴堵塞



如果鼻噴劑看似未能正常運作：

- ▲ 透過窗格內的液體水平檢查是否仍有剩餘藥物。如果水平太低，剩餘藥物可能不足以讓鼻噴劑正常運作
- ▲ 檢查鼻噴劑是否有損壞
- ▲ 如果您認為噴嘴可能被堵塞，請勿使用別針或任何利器來清潔
- ▲ 嘗試依「如何準備鼻噴劑」的指示來重新備妥鼻噴劑

現在您可以隨時使用您的鼻噴劑