

重要注意事項

- 此藥品無明顯氣味，不需要擔心沒有吸入藥物。
- 請勿搖晃吸入器，手指不要擋住通氣孔，也不要對著吸入器吹氣。
- 每一次使用後，劑量計數器上的數字會逐次減少。
- 如果聽到「喀喀」聲時，劑量計數器的數字沒有減少，就無法從吸入器吸入所需的劑量，此時請帶著吸入器尋求藥師協助。

英文產品名稱：INCRUSE ELLIPTA 55 mcg Inhalation Powder
衛部藥輸字第026500號

中文產品名稱：英克賜易利達 55 mcg乾粉吸入劑

適應症與用途：INCRUSE ELLIPTA 是一種抗膽鹼激性藥物，適用於以長期每日使用一次的方式做為慢性阻塞性肺病(COPD)患者之氣道阻塞症狀的維持治療用藥。

成份含量：umeclidinium 55 mcg

用法用量：應以每天吸入一次的方式投藥，且僅可經口吸入。應每天於相同時間投藥。每24小時不可使用INCRUSE ELLIPTA超過1次。

劑型：乾粉吸入劑

禁忌症：嚴重乳蛋白過敏
對umeclidinium或任何賦形劑過敏

警語和注意事項：
對病情正在快速惡化或發生可能危及生命之發作事件的COPD患者，不可開始使用。
不可用於緩解急性症狀。急性症狀應使用吸入性短效型 β_2 作用劑來治療。

和其他的吸入性藥物一樣，INCRUSE ELLIPTA 可能會引發反常性支氣管痙攣，這可能會危及生命。如果在投予後發生反常性支氣管痙攣，應立即使用吸入性短效型支氣管擴張劑治療、立即停用、並施以替代性治療。

對患有狹角性青光眼的患者，使用時應謹慎。處方醫師和患者都應注意是否出現急性狹角性青光眼的徵兆及症狀(如眼睛疼痛或不適、視覺模糊、與充血性結膜炎所造成的紅眼有關之視覺上有光影或多彩影像及角膜水腫)。

對有尿滯留問題的患者，使用時應謹慎。處方醫師和患者都應注意是否出現尿滯留的徵兆及症狀(如排尿困難、排尿疼痛)，尤其是前列腺肥大或膀胱頸阻滯的患者。

常見副作用：鼻咽炎、上呼吸道感染

ELLIPTA 為葛蘭素史克藥廠註冊商標

INCRUSE 及 ELLIPTA 為 GSK 集團公司註冊商標

INCRUSE ELLIPTA 由 GSK 與 INNOVIVA 公司共同研發

INCRUSE ELLIPTA
umeclidinium
RAISING EXPECTATIONS IN COPD

INNOVIVA



TW/INC/0004/17a-Aug-2107

INCRUSE ELLIPTA 吸入器使用說明

本說明書僅提供有被處方此藥品之患者
正確使用 INCRUSE ELLIPTA 吸入器



請您務必詳閱 INCRUSE ELLIPTA 包裝盒內的患者須知，
瞭解本藥物的重要資訊。如果對藥物有任何問題，
請隨時詢問醫師、護理師或藥師。

INCRUSE ELLIPTA
umeclidinium
RAISING EXPECTATIONS IN COPD

如何使用

要吸藥時才可以打開蓋子，如果打開蓋子，沒有吸入藥物就關上，就會損失一次藥物劑量。

1 打開



- 把蓋子往下推，直到聽見「喀嚓」聲。
- 吸入器先不要靠近嘴邊，在適當範圍內先儘量吐氣。

2 吸入



- 雙唇確實含著吸嘴，不要有空隙。
- 此時請以長而穩定的方式深吸一口氣，然後閉氣至少3-4秒。請勿由您的鼻子吸入。

3 關上



- 取出吸入器，慢慢吐氣。
- 將蓋子往上推，確實蓋住吸嘴。
- 如有需要可使用乾面紙清潔吸口。